

類聚方集覽

全



814
322

誤字考正

賜谷先生著

類聚方集覽

金

生績堂藏

類聚方集覽標註序

東洞子所著之方極類聚方二

書及醫方分量皆醫家大寶

也故今集之令可一覽以便

用又粗有所得者註之其標以

示^ス子^ニ弟^ニ也然^レ方^ハ極^ニ之文固^コ貴^キ簡^ニ
故^ニ世^ニ人^ハ遽^タ見^テ或^ハ以^ハ爲^ス不^レ詳^ナ今^ニ往^ニ
注^ニ補^ニ註^{スル}其^{スル}主^ニ症^ヲ者^ハ以^ハ爲^ス禪^ニ其^{スル}
術^ヲ也若^キ夫^ニ類^ニ聚^ニ方^ヲ者^ハ殊^ニ貴^キ精^ニ嚴^ニ
故^ニ域^ニ而^レ刪^{スル}之^ニ至^リ或^ハ有^テ方^ハ無^キ症^ヲ者

多矣蒙士必有疑焉抑古人言
稱六經動及陰陽其志蓋始於
取譬則區別其症之目已言子
不取者惡其辭也惡其辭者爲
蒙士固執以生惑之故已雖然刪


之如斯則有方而無症者不女
世豈得莫有疑者哉今此舉也
舊所刪而再收之亦不尠者乃
以欲明其術也要之舊刪與再
收兩存之則子弟之業思過半

矣故舊本矩而域之者不敢削
之有再收者圈其傍以別之皆
標揭其說以審事情其他所附
出皆平生所施之治驗與張氏
遺書其義相得之說而冀有レ

補其術者已暫言其凡例以為
之序爾

享和三癸亥五月

上總 雉間煥 子昂撰



類聚方集覽目錄

桂枝湯 卷三

桂枝加桂湯 卷五

桂枝加芍藥湯 卷二

桂枝去芍藥湯 卷五

桂枝加葛根湯 卷六

栝蒌桂枝湯 卷六

桂枝加黃耆湯 卷八

桂枝加芍藥大黃湯 卷七

桂枝加厚朴杏仁湯 卷八

烏頭桂枝湯 卷八

桂枝加附子湯 卷八

桂枝芍藥加附子湯 卷九

桂枝附子湯 卷九

桂枝附子去桂加朮湯 卷九

桂枝去桂加苓朮湯 卷九

桂枝芍藥加黃辛附湯 卷九

桂枝芍藥加皂莢湯 卷九

桂枝加龍骨牡蠣湯 卷九

桂枝芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 卷九

桂枝加芍藥生姜人參湯

四

桂枝去麻黃湯

四

桂枝二越婢湯

五

桂枝麻黃各半湯

五

小建中湯

六

黃耆建中湯

七

黃耆桂枝五物湯

七

黃耆桂枝苦酒湯

八

桂枝甘艸湯

八

半夏散

八

桂枝甘艸附子湯

九

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

九

桂枝人參湯

二

人參湯

十

茯苓甘草湯

十一

茯苓杏仁甘草湯

十二

茯苓戎鹽湯

十三

葵子茯苓散

十三

苓姜朮甘湯

十四

苓桂朮甘湯

十五

苓桂甘棗湯

十六

苓桂五味甘艸湯四

苓甘五味杏辛湯五

苓甘杏味辛夏湯四

苓甘姜味辛夏仁湯六

苓甘姜味辛夏仁黃湯六

茯苓澤瀉湯七

澤瀉湯七

白苓散七

茵陳五苓散九

猪苓湯九

猪苓散三

牡蠣澤瀉散一

八味丸一

栝瞿麥丸一

麻黃湯一

麻黃加朮湯一

麻黃甘草湯四

麻黃附子甘艸湯四

麻黃附子細辛湯五

麻黃杏仁甘艸石膏湯五

麻黃杏仁薏苡甘艸湯五

牡蠣湯六

麻黃淳酒湯六

小青龍湯七

文蛤湯九

越婢加朮湯十

葛根湯四

葛根黃連黃芩湯四

芫胡加芒消湯十

芫胡去半夏加栝蒌湯八

芫胡加桂枝湯四

芫胡加龍骨牡蠣湯十五

白虎湯五

生夏麻黃九六

大青龍湯八

越婢湯九

越婢加半夏湯十四

葛根加半夏湯四

小芫胡湯四

芫胡姜圭湯九

大芫胡湯十五

白朮加人蔘湯二十五

白虎加桂枝湯二五

小承氣湯十一

厚朴五物湯二六

厚朴七物湯三

大承氣湯四

大黃黃連瀉心湯八

瀉心湯九

附子瀉心湯九

大黃附子湯十

大黃甘遂湯十一

抵當湯十一

抵當丸二

蠭皮大黃朴硝湯二

大黃硝石湯二

大黃牡丹皮湯三

大黃甘艸湯三

調胃承氣湯四

桃枝承氣湯五

下瘀血湯六

土瓜根散六

甘艸湯七

桔梗湯七

排膿湯七十

甘遂半夏湯八十

甘麥大棗湯九十

生薑甘草湯一百

四逆湯一百一十

四逆加人蔘湯一百二十

通脈四逆加豬膽汁湯一百三十

附子搜米湯一百四十

薏苡附子敗壞散一百五十

白通加豬胆汁湯一百六十

烏頭湯一百七十

芍藥甘草湯一百八十

芍藥甘草附子湯一百九十

甘草粉蜜湯二百

甘草乾薑湯二百一十

通脈四逆湯二百二十

茯苓四逆湯二百三十

乾姜附子散二百四十

薏苡附子散二百五十

白通湯二百六十

大烏頭煎二百七十

赤丸散二百八十

眞武湯

八

天雄散

一三

施子甘草豉湯

一

枳實施子豉湯

一

茵陳蒿湯

三

施子厚朴湯

三

大陷胸湯

四

小陷胸湯

六

栝蒌薤白半夏湯

七

文蛤湯

八

小半夏湯

九

附子湯

九

施子豉湯

一三

施子牛姜豉湯

一

施子大黃豉湯

二

施子蘘皮湯

三

施子下姜湯

三

大陷胸丸

五

栝蒌薤白白酒湯

五

瓜蒂散

七

大半夏湯

八

生薑半夏湯

九

小半夏加茯苓湯十四

半夏苦酒湯十四

半夏厚朴湯十四

半夏乾姜散十四

下姜人參半夏丸十四

半夏瀉心湯十四

甘艸瀉心湯十四

生姜瀉心湯十四

吳茱萸湯十四

厚朴生姜半夏甘草人參湯十四

黃連湯十四

干姜黃連黃芩人參湯十四

大建中湯十四

黃連阿膠湯十四

黃芩湯十四

黃芩加半夏生姜湯十四

六物黃芩湯十四

二物黃芩湯十四

白頭翁湯十四

白頭翁加甘艸阿膠湯十四

木防已湯四十

木防已去石膏加茯苓芩消湯四十

防已茯苓湯四十

防已黃耆湯五十

枳實芍藥散五十

枳朮湯五十

排膿散五十

桂枝枳實生姜湯五十

枳實薤白桂枝湯五十

橘皮枳實生姜湯五十

茯苓飲五十

橘皮竹茹湯五十

橘皮湯五十

桂枝茯苓丸三十

芎歸膠艾湯五十

旋覆花代赭石湯五十

赤石脂禹餘糧湯五十

桃花湯五十

大猪胆汁方五十

蜜煎導方五十

酸棗仁湯 七十

葶藶大棗瀉肺湯 七十

麻子仁丸 五十

己椒藶黃丸 五十

蜀漆散 五十

十棗湯 五十

桔梗白散 五十

走馬湯 六十

備急圓 六十

礬石湯 六十

消礬散 六十

礬石丸 六十

蛇床子散 六十

既試方丸方

竹葉石膏湯 六十

麥門冬湯 三十

炙甘草湯 六十

烏梅丸 六十

桂枝芍藥知母湯 六十

頭風摩散 六十

栢葉湯

六十五

當歸芍藥散

六十六

黃土湯

六十七

古風竹譜卷之二
竹之類

竹之類

五蒸湯 虛勞骨蒸方解五蒸熱

夜令人夢中

竹葉葛根地黃

知母黃芩石膏

梗本

右十味

此五胡散治骨蒸

熱喘咳甚者

五胡散地骨皮去骨

此胡青蒿甘草

知母烏梅

右八味

既試方

射干麻黃湯

射干三分麻黃生薑

各四分

細辛紫苑欬冬花

各三分五味子六分大棗一分半夏六分

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上

沫內諸藥煮取三升分溫三服

欬而上氣喉中水雞聲

厚朴麻黃湯

既試方

鐵砂湯

長冬桂支寸許

白朮 郭分 鐵粉

壯陽

右七味 治虛悸短

氣眩暈虛煩

脾方

治急驚風 搐惕者

無旦一分 辰砂少

右三味 生薑汁和

用之

折衝飲

當歸 川芎 芍藥

厚朴三分 麻黃

二分五厘

石膏五分 杏仁半夏各

四分 干姜細辛

各一分五厘

小麥一錢 五味子

四分

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內

諸藥煮取三升溫服一升日三服

欬而脉浮者

皂莢丸

皂莢八兩刮去皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三

壯丹 有竹 紅花 牛膝 當歸 桂枝

千金方將陽治產後惡露不盡若腰痛不大便者

人黃當飯日計生身

牡丹為系是兼人多

右八味

○治腰痛有奇驗

如婦人或發寒則

左打撲之人亦同

折傷方

牡丹芍藥仁枳

芍藥

沈降豁胸陽治水腫脚

之困或支飲

沈重金附月中名効

金附月桑白吳茱

九日三夜一服

欬而上氣時時吐濁唾但坐不得眠

桂枝芍藥知母湯

桂枝知母防風

各四分

芍藥三分甘草麻黃各

二分生薑蒼朮

各五分

附子

一分五厘

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三

服

諸支節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣

既試方

七味降氣湯

ソ子桑白 羊隻 茯苓

去屑皮 白且香所或加木

通生薑

脫花並

桂枝 車前 當歸 川芎

午膝 紅花

去莖 附子

喉痺湯 治疳毒咽喉爛

者

甘州 桂枝 乾薑 且附子

山蓮 山參

小解毒湯

山夜 連中 山參 山加 山

沃得 飲之 將阿膠

清毒聖藥湯

可也 此丹 壯丹 虎子 瓜粉 細辛 倍用

溫溫飲吐

當歸四通湯

當歸 桂枝 芍藥 細辛

各四分

大棗一錢 甘州三

分

通艸

三分

右七味以水八升煮取三升去滓溫一升日

三服

手足厥寒脉細欲絕者當歸四通湯主之若

其人內有久寒者宜當歸四通加吳茱萸生

干散水湯

酸枣仁人多桂枝石膏

炙甘草叶生姜

當飯飲 主治婦人產後

上逆喘ヲリ船后婦

者或血目眩ヨク

婦人血道ヨク

當飯芍藥牡丹皮

澤厚茯苓黃芩

桂枝干姜甘草

辰砂

清淨子陽主治水腫

上病ヨク淋病膿血痛

忌ヒク多小便不利者

防己白朮琥珀沢子

阿子瞿麦天山甘草

姜湯主之

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

於前方内加吳茱萸六分生薑一錢

竹葉石膏湯 治枯燥氣逆或欲吐者

竹葉四分石膏一分錢半夏四分人參二分甘州

五厘米七分麥門冬八分

右七味以水一斗煮取六升去滓内粳米煮

米熟湯成去米温服一升日二服

飢試方

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

麥門冬湯

麥門冬

二錢七分

半夏四分人參二分甘艸

一分五厘

粳米四分六棗二分

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升

日三夜一服

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者

炙甘艸湯

○行動如常而其脈結代心中動悸

如有驚惕者非此方不能治之

甘州二分五厘生薑二分人參五厘生地黃二分

桂枝二分阿膠五厘麥門冬七分麻仁四分

大棗五分

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烱消盡溫服一升日三服一名

復脉湯

治傷寒脉結代心動悸者○治虛勞不足汗出而悶脉結悸行動如常○治肺痿涎唾多

既試方

心中溫濕液液者

栢葉湯

栢葉干姜

各六分

艾二錢

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一

升分溫再服

治吐血不止者

黃土湯

甘州乾地黄米附子阿膠黃芩

各四分 竈中
五厘

○反胃之症世醫
難其治此方速治
之實奇劑也

黃土二錢

右七味以水八升煮取三升溫服

下血先便後血此遠血也

烏梅丸

烏梅九十細辛十附子十桂枝十人參十黃柏十各十錢干

姜二錢黃連二錢當歸十川椒各八

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相

既試方

得內日中與蜜杵二千下丸梧子大先食飲
服十九日二服稍加至二十九禁生冷滑物
臭食等

虵厥者當吐虵令病者靜而復時煩此為厥
寒虵卜入臍故煩須臾復止得食而嘔又煩
者虵聞食臭出其人常自吐虵虵厥者

當歸芍藥散

當歸芍藥

各三兩

芍藥一斤茯苓

各四兩

澤瀉

○治小便微難腹
中痛者

半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服

婦人懷妊腹中疝痛

大黃蟻蟲丸

大黃十分黃芩二兩甘艸三兩桃仁一升杏

仁一升芍藥四兩乾漆一兩乾地黄十兩蠱蟲

一升水蛭百枚蟻蠟一升蟻蛭半斤

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五

九日三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷

房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血

肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛

頭風摩散

大附子一枚鹽等分

右二味為散沐了以方寸匕已摩疾上令藥

氣行

○芍藥甘草大棗二味雖有小異其所主治則攣急也桂枝湯有此三味而方極不言攣急症者以不待其言而可知故也方極桂枝加芍藥湯下云本方症而拘攣劇者桂枝去芍藥湯下云本方症而不拘攣者桂枝加芍藥生姜人參湯症云或拘攣可以見已

類聚方集覽上

日本

南總

雉問煥子炳標注

男

適之適校

桂枝湯

治上衝

桂枝

頭痛

桂枝

發熱

桂枝

汗出

桂枝

惡

風

桂枝生姜

者

桂枝芍藥生姜各三两大棗十二枚

今用各七分五厘

厘

甘草二兩

五分

右伍味咬咀以水米升微火煮取三升去滓

症一藥不必相對
要之諸方皆衆藥
併力以成其功耳
故每證注其主藥
者唯示綱概而已
○按其發汗也有
非如水流漓病必
不除者又有大汗
出後風氣去聲氣
在者不可一概而
論之宜慎之

適寒溫服一升

今以水一合四勺煮取六勺服

服已須臾歎

熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍

身漿漿微似有汗者益佳不可令如水流漓

病必不除若一服汗出病差停後服不必盡

劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其

間半日許令二服盡若病重者一日一夜服

周時觀之服一劑盡病症猶在者更作服若

汗不出者乃服至二三劑

○凡稱太陽者主
桂枝麻黃葛根等
之症是
中風者猶言傷風

○煩者苦悶之謂
而是瞋眩也雖眩
眩病未得除故又
用桂枝湯也

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱
者汗自出齋齋惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻
鳴乾嘔者○太陽病頭痛發熱汗出惡風者
○太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯
方用前法若不上衝者不可與之○太陽病
初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府卻
與桂枝湯則愈○太陽病三日已發汗若吐
若下若溫鍼仍不解者此為壞病桂枝不中

與也觀其脉證知犯何逆隨證治之○桂枝

本為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不

可與也常須知此勿令誤也○若酒客病不

可與桂枝湯得湯則嘔以酒客不喜甘故也

○太陽病外證未解脉浮弱者當以汗解

太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲

解外者○太陽病先發汗不解而復下之脉

浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今

○頭痛有熱但挂枝症而已若六七日不大便且小便不清者乃承氣症也服承氣湯則上衝得降若小便清者宜服挂枝湯○先其時發汗者凡治潮熱之要術也不潮則不得日時發熱曰先其時也余常治今稱病者若遇上衝發熱

脉浮故知在外當須解外則愈○病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則愈○病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈○傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄○傷寒發汗

汗出等症則以桂枝湯先其發熱時溫服須臾歔熱稀粥溫覆以待其發熱而取汗或遇柴胡白虎等症乃各隨症處方服之如桂枝湯法凡瘧瘧皆一服即愈其他潮熱似瘧者其治皆同蜀漆散即截瘧藥也其下云未發前服亦先其時之謂也

解半日許復煩脉浮數者可更發汗○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者○傷寒六下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯○陽

○復煩者病未盡故也小柴胡湯有此例宜併觀
○清便自調者謂

清穀止也清穀雖

止身疼痛未愈者

猶宜四逆輩恐非

挂枝湯症

○稱陽明病者有

潮熱譫語燥屎等

之症是也

○下利腹脹滿以

下三條皆非挂枝

湯症與清便自調

條義同

明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發

汗○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所

發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者

宜發汗下之與大承氣湯發汗宜挂枝湯○

太陰病脉浮者可發汗○下利腹脹滿身體

疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻

表挂枝湯○吐利止而身痛不休者當消息

和解其外宜挂枝湯少和之○下利後身疼

痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗

婦人得平脉陰脉小弱其人渴不能食無寒

熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此

症設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

○產後中風續之數十日不解頭微痛惡寒

時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦証續

在耳○服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂枝

湯如前法若形如癰日再發者汗出必解宜

○服桂枝湯大汗出者亦暝眩而病未得除故耳脉洪大穀細不拘而可也

○若形如瘡四字檢桂枝二麻黃一

湯條無域焉於此條域者恐轉訛

奔豚主劑雖居多特加桂湯為最可也○又灸後有發大熱不止是火邪也今謂之炷熱又稱灼熱此方主之生平頭痛有時發者之一二日或四五日其甚則昏迷吐逆絕飲食惡藥氣者每發服此則速起○或每天陰發兩頭痛者亦當服之能免其患也○燒鍼下恐有脫誤

桂枝二麻黃一湯

桂枝加桂湯 治本方證而上衝劇倍加者

於桂枝湯方內加桂二兩

桂枝錢芍藥大棗生姜各六分

右五味煮如本方

燒鍼令其汗鍼處被寒枝起而赤者必發奔

豚氣從少腹上衝心者灸其枝上各一壯與

桂枝加桂湯

此方治腹拘攣劇者誠然然遍身拘

攣皆治之則腹字

忠衍文○治奔豚

拘攣劇者

東洞子曰腹滿時

痛者拘急而痛也

是以芍藥為主爾

○舊刊有脫文故

今收之

○東洞子曰不拘

急故去芍藥煥譚

按脉促胸滿非此方所主而舊刊不刪者恐寫誤然若删脉促胸

挂枝加芍藥湯

治本方證而腹拘攣劇

倍加芍藥

者

於本方內加芍藥三兩

挂枝大棗生姜

各六分

芍藥

一分

甘草

四分

右五味煮如本方

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太

陰也挂枝加芍藥湯主之大實痛者挂枝加

大黃湯主之

挂枝去芍藥湯

治本方證而腹不拘攣

去芍藥

所主而舊刊不刪者恐寫誤然若删脉促胸

滿則有方而無症焉又挂枝湯中去芍藥則其義可說而其方不可用也蓋或變方或合方出於此方者不少故存以備參觀

驚癇及破傷風角弓反張者即項背強急凡凡之狀也宜此方

者於挂枝湯方內去芍藥

挂枝大棗生姜各九分甘草六分

右四味煮如本方

太陽病下之後脉促胸滿者挂枝去芍藥湯

主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主

之

挂枝加葛根湯治挂枝湯證而項背強急

葛根

者於挂枝湯方內加葛根四兩

桂枝芍藥大棗生姜

各六分

甘草

四分葛根

八分

右六味煮如桂枝湯

太陽病項背強几几反汗出惡風者

括蕒桂枝湯

治桂枝湯證而渴

括蕒者

於桂枝湯方內加括蕒根二兩

桂枝芍藥大棗生姜

各六分

括蕒甘艸

各四分

右六味煮如桂枝湯

太陽病其證備身體強几几然脉反沉遲此

○病角弓反張者此為痙瘓病有渴者主之
此方極言似不詳然其言率貴簡者小一隅之義也我悲子弟不能遽見而知其蘊奧故往往贅言以詳悉其主症以示企及之徒已
○括蕒根余常用天花粉奏功至速

○東洞子曰黃耆主治皮膚水氣可考藥錄○千金外臺並用黃耆五

兩○黃病宜利小便

者用茵陳五苓散

類當以汗解之者

用麻黃湯酒湯類

有自汗盜汗而身

重者用此方

世稱勞瘵者多如

此故曰勞氣也日

久將斃之間生惡

瘡者間有之然則

用七寶丸搗肉散

類而救勞瘵者蓋

亦有之志于仁者

宜深思焉

為瘰

桂枝加黃耆湯

治桂枝湯證而黃汗黃耆自汗

黃盜汗黃耆者

於桂枝湯方內加黃耆二兩

桂枝芍藥人棗生姜

各六分

甘草黃耆

四分

右六味煮如桂枝湯

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食

已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗

出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止

按諸病黃家條備參考者而已

○甲錯者皮膚枯燥鱗甲錯出也

按當以汗解之者非此方所主也

○東洞子曰桂枝加大黃湯因桂枝加芍藥湯加大黃者也故方名從之矣

○治小兒宿食不化而腹痛者若嘔者倍大黃凡用此方宜倍加大黃

者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身潤即胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰體弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩燥小便不利此為黃汗○諸病黃家但利其小便假令脉浮當以汗解之

桂枝加芍藥大黃湯 治桂枝加芍藥湯證而有停滯人者

於桂枝加芍藥湯方內加大黃一兩

大實痛者拘急殊甚腹中大結實而痛也

○東洞子曰當有胸滿症

按曰當有胸滿症當有上衝症類皆經文其症闕故補之也以下倣之

桂枝大棗生姜各六分芍藥錢一分甘草四分大

黃二分右六味煮如桂枝湯

○太。陽。病。醫。反。下。之。因。爾。腹。滿。時。痛。者。屬。太

陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加

大黃湯主之

桂枝加厚朴杏子湯 治桂枝湯證而胸滿厚朴

微喘杏子者

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏子五十個

○灸刺諸藥不能
治抵當用此方至
言哉此方之妙起
死起廢不可勝數
也余常見中風卒
倒或癰痰不語破
傷風牙關緊急失
音傷寒厥逆四逆
輩不能救者若向
死冷汗如膏或腹
中切痛及驚風癰
風痛風白虎歷節
一切逆冷不仁諸
痼癰疾諸藥不能
救者屢與此湯得
功至多又諸瘡癰用

桂枝芍藥大棗生姜

各六分

甘草厚朴杏子

各四分

右七味煮如桂枝湯

喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳（天陽病下）

之微喘者表未解故也

烏頭桂枝湯

治腹中絞痛頭手足逆冷頭或

不仁頭若疼痛頭者

烏頭五枚

錢二

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五

功至多又諸瘡癰用之內托排膿之功至速也最可奇者走馬湯備急

圓紫圓等方下。所謂諸卒暴急病以此方起死回生者如神皆余平生所得也。古語曰病者苦急。

則急食甘以緩之。

至哉此言烏頭和。

蜜則如龍象雲矣。

然膜眩亦不少始。

宜少與之不知乃。

加之此蓋抵當之。

謂乎如上及謂諸。

難証急病非大毒。

駿烈劑則不能抵。

當世人漫畏膜眩。

多難服之者豈不。

嘆哉。

○東洞子曰是烏。

頭煎而合挂枝湯。

合解之得。一升後初服二合。不知即服三合。

又不知後加至五合。其知者如醉狀得吐者。

為中病。以水九勺煮烏頭取三勺去滓內蜜。

勺合之服。六勺。再煎取六勺。別煮挂枝湯取六。

頭相和以水煮服亦可也。法依挂枝湯然不。

及蜜煎。○寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身。

疼痛灸刺諸藥不能治抵當用此方。

挂枝加附子湯。治挂枝湯證而惡寒。

附子支節。

微痛。附子者。

方也當列烏頭煎
方後今列之挂枝
加附子湯者示其
異也又按煎法可
依天烏頭煎之法
挂枝加附子湯
治後世不謂痛風
者又曰小便難是
附子餘力足以治
之也

於挂枝湯方內加附子一枚

挂枝芍藥大棗生姜各六分
甘州分附子分

右六味如挂枝湯煮之服

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四

支微急難以屈伸者

挂枝去芍藥加附子湯 治挂枝去芍藥湯證

而惡寒附者

於挂枝去芍藥湯方內加附子一枚

桂枝大棗生姜各七分五厘 甘州五厘 附子八厘

右五味煮如桂枝湯

太陽病下之後脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

桂枝附子湯 治桂枝去芍藥湯證而身體疼

痛附不能自轉側附子大者

桂枝四兩八分 附子三枚九分 甘草二兩四分 生姜

。東洞子曰賞有上衝症此方與桂枝去芍藥加附子湯同而治與方名異彼方下云微惡寒此方下云身體

疼煩惡寒輕疼煩重獨在附子多少

也已

○今稱痛風者及上衛難降者主之

皆宜加木

○曰不嘔不渴者

身疼外無所患之謂也不與生薑相

關

○去桂加木湯者

即白朮附子湯也

曰大便鞭小便自

利者去桂加木大

似不可解者且用附子方多而獨稱服後身痺如冒狀則瞑眩為

三兩大棗十二枚各六分

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

以水一合八勺煮取六勺

傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不能自轉

側不嘔不渴脉浮虛而瀉者桂枝附子湯主

之若其人大便鞭小便自利者去桂枝加木

湯主之

桂枝附子去桂加木湯

治前方證而大便鞭

甚亦可怪因屢試附子照眩則效速而合蜜則如人皆知之又用此方其
人大便秘硬則照眩
大養功粗似合蜜
者若以桂苓芍藥
類加此方以用之
或用之大便不艱
之人則照眩稍少
得効亦微然則大
便艱者附子成功
之機也病解而大
便亦通此是附子
餘力所及也蓋桂
苓芍有降衝通解
拘攣壓動悸之力
故胸腹開爽照眩
直差此無他藥氣

子小便自利非不上衝桂者

於桂枝附子湯方內去桂加朮四兩

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服

一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如

冒狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得

除故耳

附子九分朮八分甘草四分大棗生薑各六分

右五味煮如本方

走而下以不暇止
而攻病故也甘草
大棗之甘則緩其
急而停壅於寒氣
今不得走故米附
遲力以迫逐水氣
此所以順眩也
小便自利者水之
積長於不利故溢
出者也
桂枝去桂加苓
米附湯桂枝加苓
米湯桂枝加苓米
附湯桂枝加米附
湯皆從此方變者
也隨症用之成功
甚多且加苓米附
湯最治痛風病自
小便去然此數方

傷寒八九日風溼相搏身體疼痛不能自轉

側不嘔不渴脉浮虛而瀼者桂枝附子湯主

之若大便鞭小便自利者

桂枝去桂加苓米湯 治桂枝湯證而悸茯苓小

便不利 米不上衝桂枝去者

於桂枝湯方內去桂加苓米各三兩

芍藥大棗生姜茯苓米各六分 甘草四分

右六味煮如桂枝湯

未知其所出也。頭項強痛發熱無汗與此方相逆。延總似葛根湯症。

。東洞子曰證不

備也此方合桂枝

去芍藥湯與麻黃

附子細辛湯也證

富於上方之下案

也藥微有辨

按藥微云桂姜棗

艸黃辛附湯枳朮

湯二方同因則證

煥按金匱要畧二

方相攝連且二方

言證正同而枳朮

湯但不曰氣分耳

此枳朮湯不謂因

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無

汗心下滿微痛小便不利者

桂姜棗艸黃辛附湯 治桂枝去芍藥湯與麻

黃附子細辛湯二方證相合者

桂枝生薑各三兩大棗十二枚各六分甘草麻

黃細辛各二兩四分附子一枚三分

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮

取二升分溫三服當汗出如魚行皮中即愈

也而吉子曰二方同因者何也抑是

與腎氣丸亦主之麻黃甘草湯亦主

之之類一例也故氣分字管枳朮湯而二方同因也夫氣血固不拘然既

曰氣分豈無說乎長沙方中曰亦主之者多有焉因並觀之

毒所在之部位則有表裡上下之不同也此二方亦雖同曰氣分乎實有

氣血之別焉一則心下堅大而屬血分者一則心下堅大而屬氣分者直

指方云氣為痰飲更隔心下堅脹名曰氣分加味枳朮湯潔而留滯血化

為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分調榮飲八門亦粗同此因金匱立說

雖不出古欲強別氣分血分則足以為微乎麻黃附子細辛湯下吉子曰

有痰飲之變也若非一定之證也心下堅大證調榮飲證並可稱痰飲

之變之一也且曰當汗出如蠶行皮中即愈此亦病在皮表與調榮飲證

相同也因是觀之桂枝湯附湯為血分也明矣夫氣血不拘者固

又實難別而諸家別之者蓋以皮肉赤紋為瘀血之變乎壹是皆水氣也

故吉子謂之痰飲之變金匱云人則經水不通經為血血不利則為水

以水合四勺煮取六勺

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作

名曰血分諸家因曰瘀血化為水吉子以為水與血一也學者思諸

○加皂莢湯主小兒平生垂涎者其甚者為鼻淵為風涎潮而口鼻間及腮赤者皆主之

○東洞子曰當有胸腹動症

桂枝去芍藥加皂莢湯 治桂枝去芍藥湯證

而吐濁唾涎沫者

皂莢者

於桂枝湯方內去芍藥加皂莢二枚

桂枝生薑大棗

各七分五厘

甘草皂莢

各五分

右五味煮如桂枝湯

肺痿吐涎沫者

桂枝加龍骨牡蠣湯 治桂枝湯證而胸腹

龍骨有動者

○又手冒心者主
之是近方傷寒門
升陽散火湯症而
胸腹有動者也

○小腹弦急與挑
拔承氣症小腹急
結異也常從小腹
引陰頭弦急且晝
夜思色之者
也男女正同又陰
吹正喧玉門不閉
時自漏精者主治與夢交同矣。如蜀漆龍骨牡蠣湯東洞子曰當有

於桂枝湯方內加龍骨牡蠣各三兩

桂枝芍藥大棗生姜龍骨牡蠣各四分甘

草分三右七味煮如桂枝湯

夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脉極

虛芤遲為清穀亡血失精脉得諸芤動微緊

男子失精女子夢交

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯 治桂枝去

芍藥湯證而胸牡腹龍有動劇蜀者

心腹動而衝逆證。近方黃連解毒湯證而暴熱至危者主之。又灸後大熱。諸藥不能治者主之。

東洞子曰當有心下痞鞭或拘急或嘔症

桂枝生薑蜀漆各三兩大棗十二枚各四分五厘

牡蠣五兩九分五厘龍骨四兩六分甘草二兩三分

右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內

諸藥煮取三升去滓溫服一升以水二合四勺煮取七勺

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥

不安者○火邪者

桂枝加芍藥生薑人參湯 治桂枝湯證而心

下痞鞭人參或拘攣芍藥及嘔生者

○脉沈遲字東洞
子不刪者示不拘
脉強弱也其他脉
促脉弱等當刪而
不刪者多有焉蓋
雖脉候之惡以不
足畏故也乎

○皮膚燥痒者主
之又治瘧疾服如
桂枝湯法

桂枝湯方內加芍藥生姜各一兩人參三兩

桂枝大棗人參各六分芍藥生姜各八分甘艸

分四右六味煮如桂枝湯

發汗後身疼痛脉沈遲者

桂枝二麻黃一湯治桂枝湯證多麻黃湯證

少者桂枝一兩十七銖八分五厘芍藥生姜各

一兩六銖大棗伍枚各六分麻黃十六銖杏仁

十六個各三分五厘甘艸一兩二銖五分五厘

御學急而上衡者
主之

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再一合

五勺煮取六勺○服桂枝湯大汗出脉洪大者與桂

枝湯如前法若形勢重日再發者汗出必解

桂枝二越婢一湯治桂枝湯證多越婢湯證

少者桂枝芍藥甘草麻黃各十八銖四分五厘

生姜一兩三銖七分大棗四枚石膏二十四銖

各六分右采味咬咀以五升水煮麻黃一

二沸去上沫內諸菜煮取二升去滓溫服一

升以水一合六勺煮取六勺○太陽病發熱惡寒熱多寒

少脉微弱者此無陽也不可發汗

桂枝麻黃各半湯 治桂枝湯麻黃湯二方證

相合者

桂枝一兩十六銖五分五厘芍藥生薑麻黃甘州

各一兩六分棗四枚杏仁二十四個各三分

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

○治瘧疾服之如桂枝湯法
風癰疥癩皆主之
又曰寒熱往來中
或大病將愈之時
身發斑且痒者皆
主之

○小建中湯東洞
子曰當有腹中拘
急之證其方類芍
藥甘草湯也

治痢疾

與小建中湯不差
者拘急雖緩乎以
太甜故胸腹苦悶
未爽快也因用小
建中湯而後始洗
然猶如七寶丸有
後方亟謂再快也
說具於備急圓標

內諸藥煮取一升捌合去滓溫服陸合以水

六勺煮
取六勺

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多

寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發

脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽

俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱

色者未欲解也以其不能得少汗出身必痒

小建中湯 治裏急膠腹皮拘急芍藥及急痛大棗

悸而煩者非此方
所主雖然若心煩
而拘急甚乃昏沈
恍惚者先用此方
一日而別按方以
治煩悸乃致功至
速

悸血以下裡急之
傍證也此諸症皆
兼拘急則宜服之
又曰男子黃者黃
疸未發見而在腹
內故大便秘而色
深黃所謂黃劑也
小便自利及不利
頻數淋瀝因急迫
而生者皆主之

芍藥 甘草 者

桂枝甘草生薑各三兩大棗十

二枚

各四分五厘

芍藥六兩

九分

膠飴一升

三錢

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更

上微火消解溫服一升日三服

以水一合四勺煮取六勺

去滓內膠飴

嘔家不可用建中湯以甜故也○

傷寒陽脉澁陰脉弦法當腹中急痛者先與

小建中湯不差者與小柴胡湯主之○傷寒

二三日心中悸而煩者○虛勞裏急悸衄腹

痛數淋瀝因急迫而生者皆主之又曰急迫帶下便膿血或淋瀝黃小便

自利。衄遺精。手足煩熱。口乾等症。用膠飴與它症不同。余別有考。東
洞子曰。桂枝加芍
藥湯當入于此而
以有桂枝之名。列
于彼。
○東洞子曰。當有
盜汗之證。

○東洞子曰。桂枝
加黃耆湯症而嘔
無急迫者。

中痛。夢失精。四肢痠痛。手足煩熱。咽乾口燥。

○男子黃小便自利。○婦人腹中痛。

黃耆建中湯。治小建中湯證而盜汗。黃耆黃汗

黃耆或自汗。黃耆者

於小建中湯方內加黃耆一兩半。二合

虛勞裏急。諸不足。

黃耆桂枝五物湯。治桂枝湯證而嘔。倍加身

體麻痺。黃耆芍藥不急迫。去甘者。

○此方治後世所謂麻木而滋膚湯

症者

宜隨証加求

黃耆芍藥桂枝各三兩大棗十二枚各六分生

姜六兩一分

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三

服以水一合八勺煮取六勺○血痺病從何得之師曰夫

尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出卧不時

動搖加被微風遂得之但以脉自微潛存寸

口關上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證

。沾衣正黃謂黃汗出至多也
治水病身重汗出者
按當有從小腹引陰弦急症說見干桂枝加龍骨牡蠣湯標注然彼主胸腹有動此主身體腫與多汗
宜隨證加末

身體不仁如風痺狀

黃耆桂枝若酒湯

治身體腫

黃耆若酒發熱汗出

桂枝汗沾衣

黃耆若酒

色正黃如藥汗黃耆若酒者

黃耆五兩

一分

芍藥桂枝各三兩

九分

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升

溫服一升

以苦酒二勺水一合四勺煮取六勺

當心煩服至六

七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也○

黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風

水汗沾衣色正黃如藥汗脉自沈何從得之

師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之

桂枝甘草湯

治上衝

桂枝

急迫

甘者

桂枝四兩

錢

甘草二兩

錢

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

以水

小勺煮

發汗過多其人叉手自冒心心下

悸欲得按者

半夏散及湯

治咽喉痛

甘艸

上衝

桂枝

急迫

甘

東洞子曰嘗有
急迫證

叉手冒心者亦
因上衝也

喉痺腫痛甚而
湯藥不下語言不

能或為痰涎壅盛之狀者主之

者 桂枝甘草半夏各等分錢一

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方

寸七日三服若不能散服者以水一升煎七

沸內散兩方寸匕更煎三沸下火令少冷少

少嚥之○少陰病咽中痛

桂枝甘草附子湯 治桂枝甘草湯證而骨節

煩疼附子小便不利本者

甘草术各二兩分六附子二枚分九桂枝四兩錢一

。即甘艸附子湯
東洞子曰當有衝
逆之症
治後世所謂痛風
歷節風手逆之則
痛劇者

分二 右四味以水六升煮取三升去滓温

服一升日三服初服得微汗則解能食汗出

復煩者服五合恐一升多者服六七合以水

二勺煮取六勺○風溼相搏骨節疼痛不得屈

伸逆之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不

欲去衣或身微腫者

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 治桂枝甘草湯證而

胸牡 腹有動骨及急迫 信甘 者

。火逆以下恐有
脫誤

謹按此方桂枝甘
艸主藥則桂枝甘
艸湯症而吐下心
下痞輕小便利
者主症也人參湯
即桂枝人參湯症
而不_レ上衝者主之

桂枝一兩五厘甘草牡蠣龍骨各二兩九分

右為末以水五升煮取二升半去滓溫服八

合日三服以水一合二
勺煮取六勺

火逆下之因燒鍼煩躁者

桂枝人參湯 治人參湯證而上衝桂枝
急迫
甘草

者

桂枝甘草各四兩八分米人參乾姜各三兩六分

右五味以水九升先煮四味取五升內桂夏

人參湯下稱急痛

者余竊疑轉訛且

如胸痹胸滿逆搶

本是枳實薤白桂

枝湯專主治之曰

人參湯專主治之者

示臨機應變之略

耳非專主之症也

又曰利下不止曰

霍亂故知一方用

乾薑者為治吐與

下利。協與挾通

。藥入則吐者宜

加欬秀水搜米

煮取三升溫服一升日再夜一服

以水一合八勺煮取

六○太陽病外證未除而數下之遂協熱而

利。利下不止心下痞鞭表裏不解者

人參湯

即理中丸也

治心下痞鞭

人參

小便不利

木

或急痛

甘草

或胸中痺

干姜

者

人參甘草木乾姜各三兩

七分五厘

右四味擣篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯

數合和一丸研碎溫服之日三服夜二服腹

。腎氣動，所謂腎間動也。常人有之，若其動劇，而引胸脇，若牡蛎所治也。此稱臍上築者，差後，不了了，虛羸，故其動發露者，乃桂枝人參湯証已，何必去朮，且長沙方中間有加減法，不足取。

中未熱，益至三四丸。然不及湯。湯法以四物依兩數切，用水八升，煮取三升，去滓溫服一升，日三服。以水一合六勺，煮取六勺。加減法若臍上築者，腎氣動也，去朮，加桂四兩。吐多者，去朮，加生薑三兩。下多者，還用朮。悸者，加茯苓二兩。渴欲得水者，加朮，足前成四兩半。腹中痛者，加人參，足前成四兩半。寒者，加乾姜，足前成四兩半。腹滿者，去朮，加附子一枚。服湯後如食

頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被○霍

亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散

主之寒多不用水者理中丸主之○大病差

後喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫

之○胸痺心中痞留氣結在胃胸滿脇下逆

搶心枳實薤白桂枝湯主之參湯亦主之

茯苓甘草湯治心下悸疾而上衝挂嘔生者

茯苓桂枝各二兩八分生薑三兩一分甘草一

○熱物入腹中而自覺熱不快者此胃上有寒之候也

○東洞子曰當有

衝逆嘔吐症

此方與五苓散相

表裏也說見于五

苓散條

。按厥也者逆也
衝逆者必頭汗出
若頭汗出多兼嘔
悸者此方主之

。實有微喘之症

兩_分右四味以水四升煮取二升去滓分

溫三服_{以水一合煮取六分}

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者○傷

寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓甘草

湯卻治其厥不爾水漬入胃必作利也

茯苓杏仁甘草湯 治悸_{茯苓}而胸中痺_{仁者}

茯苓三兩_{一錢五分}杏仁五十個_{一錢}甘草一兩_{五分}

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三

服不差者更服以水一合二勺煮取六勺

胸痹胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之

橘枳姜湯亦主之

茯苓戎鹽湯 治心下悸茯苓小便不利者

茯苓半斤二錢四分 朮二兩六分 戎鹽彈丸大三分

右三味先將茯苓朮煎成入鹽再煎分溫三

服以水一合二勺煮取六勺去滓內鹽令消服

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎

東洞子曰當有心下悸症又按此方煎法不審依他例當以水六升煮取三升去滓內戎鹽一二沸分溫三服。小便閉而心悸為難治此方甚奇也。心中悸而頭汗如流者亦難治也此方加桂三分服之或加川芎亦可。代戎鹽以青鹽

无可也。白魚者鯉魚也。

鹽湯並主之

葵子茯苓散

治小便不利葵心下悸葵腫滿

因小便者

葵子一斤茯苓三兩

東洞子曰當有心下悸症又按葵子一斤本脾經目作三兩今從之

此方實治妊娠水腫也域妊娠字者恐轉訛

右二味并為散飲服方寸匕日三服小便利則愈○妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡

寒起即頭眩

苓姜朮甘湯

治心下悸小便自利腰中

冷如坐水中

若體重形如水狀者

○東洞子曰當有心下悸證宜遺尿失禁者兼用見于後編

○腎著湯此方加
杏仁治妊娘腫滿
有驗

○能療上衝急迫
者病從小便去

甘艸末各二兩

五分

乾姜茯苓各四兩

錢一

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中

即溫

以水一合二勺煮取六勺

○腎著之病其人身體重

腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自

利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕

久久得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢

苓桂朮甘湯

治心下悸

茯苓

上衝

桂枝

起則頭眩

桂枝

甘草

小便不利

者

○此方合真武湯
亦名桂枝加苓朮
附湯而無大棗且
茯苓為君與先出
桂枝加苓朮附湯
少異

○腎氣丸主小腹
水氣此方主心下
有飲者

○東洞子曰當有
拘急證

茯苓四兩二分桂枝三兩九分朮甘草各二兩

六分右四味以水六升煮取三升去滓分

溫三服

以水一合二
勺煮取六勺

○傷寒若吐若下後心

下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沈緊發汗則

動經身為振振搖者○心下有痰飲胸脇支

滿目眩云々○夫短氣有微飲當從小便去之苓

桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之

苓桂甘棗湯

治臍下悸

茯苓

而攣急

大棗
甘草

上衝

。續聚久久不愈

顏色蒼然種種苦

腦或似勞瘵者加

味噎煎服人家常

用味噎也

又病卧舉體噎然

一振如有驚惕者

其間十許息而復

微噎振如此不止

者服此乃漸愈

又瘧發輒狂言不

止噎噎終日而臍

下有動者主之

。苓桂五味甘

湯以下五方皆骨

枝者

茯苓半斤

一分二錢

甘草三兩

四分五厘

大

棗十五枚

五分五厘

桂枝四兩

六分

右四味以水一斗先煮茯苓減二升內諸藥

煮取三升去滓溫服一升日三服

以水二合煮取六分

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚

苓桂五味甘艸湯

治心下悸

茯苓上衝

桂枝

五味

急迫

甘者

茯苓桂枝各四兩

八分

甘艸三

兩六分五味子半升

一分二錢

煎家要術

○以下五方隨時活用之則皆佳劑也然隨症加減之法其原言則似有理者其實不足信之何則病隨時易轉變其預期次序必如此者至稀也不可拘拘者也抑以面熱為胃熱上薰之候而加大黃者實然其說詳于調胃承氣湯標注

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服

以水一合六勺煮取六勺○數逆倚息不得卧小青龍湯

主之青龍湯下已多唾口燥寸脉沈尺脉微

手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面

翕然如醉狀因復下凍陰股小便難時復冒

者與苓桂五味甘州治其氣衝

苓甘五味姜辛湯治前方證而不上衝去痰

飲滿乾姜者茯苓四兩分甘州乾姜細

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升

日三服

以水二合
煮取六分

○水去嘔止其人形腫者

加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故

不內之若逆而內之者必厥所以然者以其

人血虛麻黃發其陽故也

苓甘姜味辛夏仁黃湯 治前方證而大便微

結人者

茯苓四兩

四分

甘草乾姜細辛大

黃各三兩

三分

五味半夏杏仁各半升

六分

○東洞子曰以上
五方當有驚悸肉
瞤筋惕等症

。茯苓澤瀉湯東洞子曰：當有心下悸或小便不利症。煥按：當有大便秘結症。嘔吐蓋因心下有支飲也。吐而渴者，胃反吐水穀而腹中空乏故也。渴而飲乃為支飲，服湯而夫飲下，則止渴差。故澤瀉之主治，非與渴者以除心下支飲故也。且澤瀉治支飲，見于澤瀉湯條。

右八味以水一斗煮取三升，去滓，溫服半升。

日三服。以水二合煮取六分（）若面熱如醉，此為胃熱。

上衛，其面加大黃以利之。

茯苓澤瀉湯 治心下悸。茯苓小便不利 求上衛。

桂枝及嘔吐。澤瀉生薑 渴欲飲水。澤瀉者

茯苓半斤。一錢二分 澤瀉生薑各四兩。六分 甘草桂

枝各二兩。三分 朮三兩。四分

右六味以水一斗煮取三升，內澤瀉，更煮取

二升半溫服八合日三服

以水二合五勺先煮五味取八勺內

澤瀉更煮取六勺

○胃反吐而渴欲飲水者

取六勺

澤瀉湯

治若胃眩

澤瀉

小便不利

未者

澤瀉五兩

二錢五分

木二兩

一錢

右二味

以水二升煮取一升分溫再服

以水一合

二勺煮取六勺

○心下有支飲其人苦冒眩

非矣

五苓散

治消渴

澤瀉猪苓

小便不利

未

或渴欲飲

水

澤瀉猪苓

水入則吐

澤瀉猪苓

者

桂枝主治衛逆或與澤瀉俱治水逆中陽病渴而小便不利者又治痲疾服如桂枝湯然微啜粥此飲煖水是為異耳又髮

脫無數十至自脫落而空缺不毛地往往而有焉者亦五苓所主也多因
肛門及前陰生瘡或在脇漏下帶下後也小兒亦主之
兼生乳解痼劑又癰疽陰拔膿大
而痛者或小兒啼怒不止隨啼隨腫
若啼怒止則陰腫亦減者及盤腸氣
類皆主之又主婦入產門出糞

澤瀉

兩六銖半

分八

猪苓茯苓各十八銖

六桂枝半兩

分四

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多

飲煖水汗出愈

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠

欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若

脉浮小便不利微熱消渴者發汗已脉浮

數煩渴者○中風發熱六七日不解而煩者

○曰意欲飲水反
不渴按彼飲者渴
故也此症初當以
汗解之而不汗誤
灌冷水故毒內攻
而益煩是以水飲
支滿心下無餘地
因雖煩渴而不能
飲故曰反不渴此
與水入則吐者一
也文蛤五苓皆為
散用者奇也且文蛤散宜以白虎湯送下之若水飲凝結逆攻心胸者非

表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆○
病在陽應以汗解之反以冷水灌之若灌之
其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲
飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓
散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白
散亦可服○太陽病寸緩關浮尺弱其人發
熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下
之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉

是五苓散所能治宜小陷胸湯或逆攻益劇衝迫咽喉者急與桔梗白散
且白虎湯標注可

併考

五苓散與茯苓甘
艸湯互有表裏相
救之力故用五苓
散若不差者宜服
茯苓甘艸湯而後
五苓散之功可見
其勢如小柴胡湯
於小建中湯是余
數經驗者也

本以下之者言
初太陽病之時誤
下之也桂枝湯條
曰攻痞宜瀉心湯

屬陽明也小便數者大便必艱不更衣十日

無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之

渴者○霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水

者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

○傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯

苓甘草湯主之○男子消渴小便反多以飲

一斗小便一斗腎氣丸主之脉浮小便不利

微熱消渴者宜利小便發汗○假令瘦人臍

宜併觀

。東洞子曰當有
小便不利或渴證
。黃病宜從小便
去之若上之豈必
待備前方症乎

東洞子曰當有便
膿血證

下有悸吐涎沫而癰眩此水也○本以下之

故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口燥

煩小便不利者

茵陳五苓散 治發黃茵陳兼前方證者

茵陳蒿末十分五苓散五分

右二物和先食飲方寸匕日三服○黃疸病

猪苓湯 治小便不利澤瀉若淋瀝阿膠若渴

欲飲水猪苓若

澤瀉

○若脉浮云云按
五苓散症也
○陽明病云云按
白虎湯症也

猪苓茯苓膠滑石澤瀉各一兩分

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內

正阿膠烱消溫服七合日一服以水一合

內膠消○若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者

○陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以

汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也

陰病下利六七日效而嘔渴心煩不得眠者

猪苓散治渴猪而心下悸茯苓小便不利者

猪苓茯苓术各等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服○嘔吐

而病在膈上後思水者解急與之思水者

牡蠣澤瀉散

治身體水腫

澤瀉等

腹中有動

牡蠣 蜀漆根 括蕒

而小便不利

商陸

者

牡蠣澤瀉括蕒根蜀漆等 商陸根海藻分

右七味異擣下篩為散更入臼中治之白飲

和服方寸匕小便利止後服日三服

○加赤小豆等分
尤妙若無葶藶宜
以甜葶代之
脚氣腫滿小便不
利者宜以八味丸
煎汁服此方

○八味丸東洞子曰外臺秘要作桂枝二兩附子二兩今從之○八
味丸之症其一按
臍下陷空沒指者
其二小腹拘急及
拘急引陰股者其
三小便不利者其
四小便反多者其
五陰痿者皆主之
聞之師云稱臍下
不仁者學者可深
思焉與他稱身體
不仁者不同
以飲一斗小便一
斗言飲而直溺不
暫停于中也與小
便清利相似或云

天病差後從腰以下有水氣者

八味丸 治臍下不仁小便不利者

乾地黄八兩山茱萸薯蕷各四兩澤瀉茯苓
牡丹皮各三兩桂枝附子各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸
日再服

腳氣上入小腹不仁○虛勞腰痛少腹拘急
小便不利者○夫短氣有微飲當從小便去

男子有此病於婦
 人即為漏下實同
 症也婦人不有此
 症猶如男子無漏
 下故特稱男子消
 渴以明婦人無之
 然東洞子剛男子
 字蓋以為此症不
 限男子乎又字歸
 膠艾湯下東洞子
 曰諸血症不別男
 女矣此漏下之主
 方也而其言如斯
 或以為應變家症
 則彼與是互用乎
 實是臆說已如其定義待君子是正

之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之男子

消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣丸

主之脉浮小便不利微熱消渴者宜利小便

發汗五苓散主之○婦人病飲食如故煩熱

不得卧而反倚息者何也曰此名轉胞不得

溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈

括萆瞿麥丸治心下悸茯苓小便不利瞿麥惡

寒附子而渴括萆根者括萆根二兩茯苓薯

實是臆說已如其定義待君子是正○加牛膝車前子名玄英湯能治婦

娠轉胞不得溺

枯薑瞿麥九東

洞子曰當有心下

悸證

但有水氣之人而

曰渴此言可味夫

有渴者何拘熱有

無卒猪苓澤瀉皆

治渴者可以徵焉

黃各三兩附子一枚瞿麥二兩

右五味末之煉蜜九梧子大飲服三九日三

服不知增至七八九以小便利腹中溫為知

小便不利者有水氣其人若渴

麻黃湯

治喘

杏仁

而無汗

麻黃

頭痛發熱惡寒

麻黃

身體疼

麻黃

者

麻黃三兩杏仁七十

個

各九分

桂枝二兩

六分

甘草一兩

二分

右四味以水九升先煮麻黃減一升去上沫

○今試煮麻黃無上沫不拘而可也其他麻黃劑皆同○治瘧疾服如桂枝湯法○啜粥亦良然有瞑眩葛根湯及諸麻黃劑皆同

內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微

似汗不須啜粥餘如桂枝法將息以水二合煮取六分

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風

無汗而喘者○太陽與陽明合病喘而胸滿

者不可下○太陽病十日以去脈浮細而嗜

卧者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯

脈但浮者○太陽病脈浮緊無汗發熱身疼

痛八九日不解表證仍在此當發其汗服藥

○凡心腹痛按之痛止者是氣通也

○傷寒耳前後及面上腫者風毒腫也宜早刺之不刺而自潰膿者危症

已微除其人發煩目瞑刺者必衄衄乃解
以然者陽氣重故也○脉浮者病在表可發汗
○脉浮而數者可發汗○傷寒脉浮緊不發汗因致衄者○陽明中風脉弦浮大而短氣
腹都滿脇下及心痛又按之氣不通鼻乾不得汗
嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳
前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證

者與麻黃湯若不尿腹滿加噦者不治○陽

明病脉浮無汗而喘者發汗則愈

麻黃加朮湯 治前方證而小便不利者

於麻黃湯方內加朮四兩

麻黃杏仁

各七分

桂枝

五分

甘草

二分半

朮

一錢

右五味煮如前方

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜

慎不可以火攻之

平日上衝難降者
宜此方
水病小便不利帶
前方證者亦主之

○東洞子曰水病而腫脹或喘或自汗出或無汗者主之
此方與越婢加朮湯二方皆主水病而此方主在表之水氣故曰或自汗或無汗亦毒在肌表之症也

○東洞子曰當有惡寒症

麻黃甘州湯

治喘急

麻黃

息迫

甘

或自汗或不

汗者

麻黃

甘州二兩

錢一

麻黃四兩

錢二

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘州

煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服慎

風寒

裏水越婢加朮湯主之甘州麻黃湯亦主之

麻黃附子甘州湯

治前方證而惡寒

附子或微

痛者

附子

麻黃甘草各二兩

錢一

附子一枚

七分五厘

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

以水

一合四勺

○少陰病得之二三日麻黃附子

甘草湯

微發汗以二三日無裏症故微發汗

也○

水之為病其脉沈小屬少陰浮者為風

無水虛脹者為氣水發其汗即已脉沈者宜

麻黃附子甘草湯浮者宜杏子湯

○少陰病者踈臥惡寒脉沈小等是也

○金匱注杏子湯

恐是麻黃杏仁甘

艸石膏湯余按應

是麻黃杏仁薤苳

甘艸湯

二

東洞子曰當有

惡寒證

按變者無窮非一

定之證豈為方之

極乎蓋有深意予

別有考

東洞子曰當有

煩渴證

麻黃附子細辛湯 治麻黃附子甘艸湯證而

不急迫 去甘 有痰飲之變 細者

麻黃細辛各二兩 錢 附子一枚 七分五厘

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服 以水

一合四勺 煮取六勺 ○ 少陰病始得之反發熱脉沉者

麻黃杏仁甘草石膏湯 治麻黃甘草湯證而

咳 杏 煩渴 石 者 麻黃四兩 八分 杏仁五十

個甘艸二兩

各四分

石膏半斤

一錢六分

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升

以水一合四勺煮取

○發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無

大熱者

麻黃杏仁薏苡甘草湯

治前方證而不煩渴

無石膏

有水氣

薏苡仁

者

麻黃半兩

二分

甘草

二兩杏仁五十個

各四分

薏苡仁半兩

一錢六分

以水五升煮取二升分溫再服汗出即愈今從之。近方溼濕湯症者主之宜隨症加木

○東洞子曰當有喘滿證外臺古今針驗作薏苡半斤麻黃四兩甘艸杏仁各二兩右四味以水五升煮取二升分溫再服汗出即愈今從之。近方溼濕湯症者主之宜隨症加木

○凡麴室浴室井中窩中窩穴庫藏及烟薰噎塞一切熱氣濕氣積鬱者急宜服此方即蘇

○骨蒸家宜隨證服此
療瘧服如桂枝湯法凡寒熱潮者治與瘧同

右剉麻豆大每服四錢匕水盞半煮八分去滓溫服有微汗避風以水一合五勺煮取六勺

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久取冷感致也

牡蠣湯 治麻黃甘州湯症而胸腹有動牡蠣蜀漆

者 牡蠣麻黃各四兩錢一甘草二兩五分蜀

漆三兩七分五厘 右四味以水八升先煮蜀

漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫

服一升若吐則勿更服

以水二合四勺先煮麻黃蜀漆得一合八

勺內二味煮取六勺

○治牡瘧

麻黃淳酒湯

治喘而發黃或身疼者

麻黃三兩

三錢

右一味以美清酒五升

二勺合煮取二升半

頓服盡冬月用酒春月用水煮之

○治黃疸

半夏麻黃丸

治喘

麻黃而嘔半者

半夏麻黃各等分

東洞子曰當有喘症或為兼用可也

有驚怖而悸者宜兼用劑

。救喉家要方

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三九日

三〇心下悸者

小青龍湯

治咳

五味細辛喘麻黃

上徹

桂枝頭痛發熱

惡風

桂枝

或乾嘔

半夏乾姜

者

麻黃芍藥乾姜甘草桂枝細辛各三兩三五分

味子半夏各半升

六分

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升

以水二合煮取六分

○加減法總無驗
及本文或渴或利
以下十七字共是
後人攙入也又曰
此方加石膏治本
方証而有心下水
氣或渴者

加減法若微利者去麻黃加薤白如雞子若
渴者去半夏加枳實根三兩若噎者去麻黃
加附子一枚若小便不利小腹滿去麻黃加
茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升
傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而咳或
渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者
傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯
已渴者此寒去欲解也○病溢飲者當發其

○二方皆主溢飲而有煩渴者大青龙湯效甚者小青龍湯

天青龍湯主之小青龍湯亦主之○效逆倚息不得卧小青龍湯主之青龍湯亦主之逆上燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣夜小腹正衝胸咽手足痺其面翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝○婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之涎沫止乃治痞瀉心湯主之

東桐子曰當有
煩渴証

大青龍湯治喘杏仁及欬嗽杏仁渴欲飲水

石木樹桂枝或身痛麻黃惡風桂枝者

麻黃六兩八分桂枝甘草各二兩杏仁四十個

生薑三兩大棗十二枚各四分石膏雞

子火新錢

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥者取三升去滓溫服一升取微似汗

汗出多者溫粉粉之一服汗者停後服汗多

東洞子曰厥逆筋惕肉𦐇直武湯證可考
。脈微弱以下恐非長沙家法當不拘焉近方家怯癖蓋因是而生
。傷寒脈浮緩條豈必為小青龍湯證乎

亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也以水一合八勺煮取五勺
太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之此脈微弱汗出惡
風者不可服服之則厥逆筋惕肉𦐇此為逆也○傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之後條辨續論皆云當是小青龍湯證
今從之○病溢飲者當發其汗汗大青龍湯主之
小青龍湯亦主之

○近方川芎茶調散証而煩渴者主

○東洞子曰大青龍湯證而不咳嗽上衝脚攣急者上之不滿當作渴自汗出之下常有或無汗字

文蛤湯

治煩渴

文蛤石膏

而喘咳

麻黃杏仁

急

甘草

三十九

文蛤石膏各五兩

七分五厘

麻黃甘草生姜各三

兩大棗十二枚

各四分五厘

杏仁五十個

三分

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出

即愈○吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主

之兼主微風脈緊頭痛

越婢湯

治大青龍湯證而不咳嗽

無上衝

無佳

者麻黃六兩

九分

石膏半斤

一錢分

生姜三

○謹按水腫或脚
疾者主之不拘渴
與熱是以不與大
青龍湯相類矣故
曰不渴無大熱

○加朮湯此方加
附子名越婢加朮
附湯本方證而有
水氣者主之

兩四分

大棗十五枚

六分甘草二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取三升分溫三服

以水一合

○風水惡

風一身悉腫脉浮不渴續自汗出無大熱

越婢加朮湯治本方証而小便不利者

於越婢湯方內加朮四兩

麻黃

六分石膏

八分大棗

朮

各四分甘草

三分

右六味煮如本方

裏水者一身面目黃腫其脉沈小便不利故

令病水假如小便自利此亡津液故令渴也

○裏水越婢加朮湯主之甘草麻黃湯亦主

之○治內極熱則身體津脫腠理開汗大泄

屬風氣下焦脚弱

○屬風氣後世名脚痺風

越婢加半夏湯治本方証而嘔者

於越婢湯方內加半夏半升

○東洞子曰當有煩渴嘔逆證

麻黃半夏各六分石膏八分生姜三分大棗四分甘

效而咽喉不利
數問微喘不語者
此謂效而止氣

葛根劑三方痢
家亦有川之疫痢
其初一二日表熱
甚者用葛根湯以
加半夏服得汗即
愈者不少也下汗
止後服兼用三黃
丸亦驚癇破傷風
類諸搐搦及張角
弓者主之桂枝加

草

右六味煮如本方

效而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮

大者

葛根湯

治項背強急

葛根

發熱

桂枝

惡風

桂枝

或

喘

麻黃

或身疼

麻黃

者

葛根四兩

六分

麻黃生薑各三兩大棗十二枚

各四分
五厘

桂枝芍藥甘草各二兩

三分

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二

類聚方集覽上

葛根湯括蕒桂枝湯類大同小異各宜隨証又治雁瘡及諸痛痒或無名者目標注所舉皆外證已外証雖則爾當主此証此謂本末也本也外証木也萬成同○東洞年曰合病條病之証非疾醫事也○氣水氣也

升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆

取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁

忌以水二合煮取六分

太陽病項背強几几無汗惡風太陽與陽

明合病者必自下利○太陽病無汗而小便

反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘕

葛根加半夏湯治本方證而嘔半者

於葛根湯方內加半夏半升

各節其難

東洞子曰賞有
項背強急心悸症

能解醒

葛根半夏各六分桂枝芍藥甘草各三分麻黃

大棗生薑各四分

右八味煮如本方

太陽與陽明合病不下利但嘔者

葛根黃連黃芩湯治項背強急葛根心悸連而

下利黃芩者葛根半斤一錢六分甘艸黃芩各

二兩四分黃連三兩六分

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥

煮取二升去滓分温再服

以水二合六勺煮取六勺

太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脉促者

表未解也喘而汗出者

小柴胡湯

治胸脇苦滿

柴胡

或寒熱往來

柴胡黃芩

或嘔半夏者

柴胡半斤

八分

黃芩人參甘草生姜各三兩大

棗十二枚

各三

半夏半升

六分

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎

○按心下痞鞭證

不可闕

○治瘧服如桂枝

法也柴胡加芒消

湯柴胡去半夏加

括蕒湯柴胡加桂

枝湯柴胡姜桂湯

大柴胡湯皆同宜

各隨其證

○加減法不足信

取三升溫服一升日三服後加減法若胸中煩而不嘔去半夏人參加枳實一枚若渴者去半夏加入人參合前成四兩半枳實根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥二兩若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈若欬者去人參大棗生姜加五味子半升乾姜二兩

以水二合四勺煮取一合
二勺去滓再煎取六勺

傷寒六七日中風往來寒熱胸脇苦滿默默

不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴

或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利

或不渴身有微熱或欬者太陽病十日以

去脈浮細而嗜臥者外証解也設胸滿脇痛

者與小柴胡湯脈但浮者麻黃湯主之血

弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於

○或胸中以十三
六字恐僂入

○脈但浮者豈必
為麻黃湯證乎

○

○以法治之者蓋
柴胡去半夏加枳
實湯

○傷寒四五日以
下非小柴胡湯証
柴胡薑桂湯証乎

脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不
欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故使
嘔也○服柴胡湯已渴者屬陽明也○以法治
之○得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足溫
醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身
黃頸項強小便難者與柴胡湯後必下重本
渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也○食穀者噦
○傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手

足溫而渴者○傷寒陽脉總陰脉弦法當腹
中急痛者先與小建中湯不差者○傷寒中
風有柴胡證但見一證便是不必悉具○凡
柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與
柴胡湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解○大
陽病過經十餘日又二三下之後四五日柴
胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急
鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡下之則愈

○經水適斷者非婦人而何婦人一字不可刪蓋筆受者誤也且熱入血室者而曰經水適斷其血必結此言大可疑又非柴胡證反是挑核承氣

○傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡更發潮熱已而微利此本柴胡証下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消湯主之○婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大

湯證也

婦人傷寒寒熱

得來經水適來者

正是熱入血室證

也其血必下而如

瘵狀謔言妄語如

有神聖者宜用小

柴胡湯加乾地黃

紅花尤効矣

近方家但以脉

別半表半裡證此

空論也以胸脇苦

滿為半表半裡之

候可也若其微旨

別有腹診之法詳

于腹診圖解

便鞭脉細者此為陽微結必有表復有裏也

脉沈亦在裏也汗出為陽微假令純陰結不

得復有外症悉入在裏此為半在裏半在外

也脉雖沈緊不得為少陰病所以然者陰不

得有汗今頭汗出故知非少陰也可與小柴

胡湯設不了了者得屎而解○傷寒五六日

嘔而發熱者柴胡湯症具而以他藥下之柴

胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為

逆必蒸蒸而振，卻發熱汗出，而解。若心下滿而鞭痛者，此為結胸也。大陷胸湯主之。但滿而不痛者，此為痞。柴胡不中與之，宜半夏瀉心湯。○陽明病發潮熱，大便溏，小便自可，胸脇滿不去者，○陽明病，脇下鞭滿，不大便而嘔，舌上白胎者，可與小柴胡湯。上焦得通，津液得下，胃氣因和，身濇然而汗出，解也。○陽明中風，脈弦浮大，而短氣，腹都滿，脇下及心

痛又按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及
 面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後肺
 刺之小差外不解病過十日脉續浮者與小
 柴胡湯脉但浮無餘症者與麻黃湯若不尿
 腹滿加噦者不治○本太陽病不解轉入少
 陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未
 吐下脉沈緊者○若已吐下發汗溫鍼譏語
 柴胡症罷此為壞病知犯何逆以法治之○

○傷寒初服小柴胡湯，差已後更發熱者，病未盡也，故再用小柴胡。若其證變者，或以汗或以下各隨其證。凡差已後再發者，皆此例也。初服瀉心者，再與瀉心。初服承氣者，再與承氣。○產後三證所多有也，各宜隨證治之。豈獨小柴胡湯而已耶？故東洞子刪之。○病鬱冒者，宜灸或忽暈絕者，宜急刺其百會以取血。產後四肢若煩熱

嘔而發熱者。○傷寒差已後更發熱者，小柴胡湯主之。○脉浮者以汗解之。○脉沉實者以下解之。○諸黃腹痛而嘔者。○新產婦人有三病：一者病瘕，二者病鬱冒，三者大便難。何謂也？曰：新產血虛，多汗出，喜中風，故令病瘕。亡血復汗，寒多，故令鬱冒。亡津液，胃燥，故大便難。產婦鬱冒，其脉微弱，不能食，大便反堅，但頭汗出，必以然者，血虛而厥，厥而必冒。冒家

此轉變生血也服
三物黃芩湯得血
下乃愈產後諸疾
久久不差或至不
救者間有此證不
可不知也

○東洞子曰小柴
胡湯證而有堅塊
者主之

欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭
汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨
盛故常汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食
婦人在艸蓐自發露得風四肢若煩熱頭痛
者與小柴胡湯頭不痛但煩者三物黃芩湯
主之

柴胡加芒消湯治柴胡湯證而若滿難解
者於小柴胡湯方內加芒消六兩

○瘧疾及諸如瘧
狀者且陽明病燥
屎之外證或迫方
家稱勞證名無根
火者皆是潮熱而
實也非虛矣東洞
子以為虛實弗可
拘故於潮熱者實
也五字域焉而異
之乎然余恐蒙士
見此乃以潮熱為
虛乎故云爾

柴胡

分八

半夏芩消

分各六

人參黃芩甘草生

姜大棗

分各三

右八味以水二合四勺煮取一合二勺去

滓再煎取六勺內芩消更上火微沸令消

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡必發潮

熱已而微利此本柴胡證下之而不得利今

反利者知醫以九藥下之非其治也潮熱者

實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒

。東洞子曰當有胸脇苦滿證

消湯主之

柴胡去半夏加枳萸湯

治小柴胡湯證而渴

枳不嘔去半夏者

於小柴胡湯方內去半夏加枳萸根四兩

柴胡

八分

人參黃芩甘草生姜大棗

各三分

枳

萸根

四

右七味煮如本方

治

瘧病發渴者亦治勞瘧

。加桂枝湯姜桂

湯下言証甚寥寥

須於小柴胡湯下

求之其他主症亦歷觀類方相通用則有益甚多猶白虎湯主症在白

虎加入參湯下夫加桂枝湯者日用佳方如家常茶飯且主功多矣由按經
曰主小柴胡湯者
而服此方則其功
勝小柴胡湯者
多可不思哉

證相合者

桂枝黃芩人參芍藥生薑各

兩半大棗六枚

各

甘草一兩

分

半夏二

合半

分

柴胡四兩

分

右九味以水柒升煮取三升去滓溫服一升

日三服

今煮如小柴胡湯

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心

下支

結

外證

未去者

○

發汗多

以

陽

證

者

不可下

與

柴胡

桂枝湯

和

其

柴

梔

以

通

津

液

中猶言傷也

東洞子曰頭汗出者是衝逆也又曰當有胸脇有動證

。今煮如小柴胡湯

後自愈○心腹卒中痛者

柴胡姜桂湯 治小柴胡湯證而不嘔去半渴

枳實而腹中有動牝上衝桂枝者

柴胡半斤分八桂枝乾姜黃芩牝蠆各三兩分三

枳實根四兩分四甘草二兩分二

右七味以水一斗 升煮取六升去滓再煎

取三升溫服 升日三服初服微煩復服汗

出便愈○傷寒五六日已發汗而復下之胸

東洞子曰當有
 胸腹動證
 此方主又手胃心
 等升陽散火湯證
 而煩躁上逆胸腹
 有動者與桂枝加
 龍骨牡蠣湯同然
 此方主苦滿是為
 小異耳

脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往
 來寒熱心煩者此為未解也○盧寒多微有
 熱或但寒不熱者

柴胡加龍骨牡蠣湯 煥案治小柴胡湯證而

胸^牡腹有動^龍心下悸^疾煩驚^丹上逆^{桂枝}

者^非半夏二合^分大棗六枚生姜人參龍

骨鈎丹桂枝茯苓牡蠣各一兩半^{各二分}柴

胡四兩^{六分}大黃二兩^{三分}

驚痢或心氣不定者主之

○東洞子曰小柴胡湯證而胸腹拘攣可下者主之又曰本方當有大黃玉函經再通一自取三升二字又曰一方以下注文也

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如

棊子更煮一二沸去滓溫服一升

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讖語

一身盡重不可轉側者

大柴胡湯治小柴胡湯證而心下痞硬去

參腹滿枳實大黃拘攣芍藥或嘔生薑人黃者

柴胡半斤八分黃芩芍藥各三兩大棗十二枚

各三分半夏半升六分生薑五兩枳實四枚各五分

金匱要略有大黃
二兩右七味作右
八味

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
溫服一升日三服一方用大黃二兩分若不
加大黃恐不為大柴胡湯也煮如小柴胡湯
太陽病過經十餘日反二三下之後四五日
柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下
急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之
則愈○傷寒十餘日熱結在裡復往來寒熱
者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結

白虎湯東洞子
曰以上三章非白

虎湯之証乃於白

虎加人參湯條下

辨之。又曰煎法可

從白虎加桂枝湯

。按口不仁者湯

而舌上乾燥生胎

故言語不利且不

知食味是也加之

以蠶語遺尿自汗

身重乃白虎証也

明矣為非白虎証

者余未得其說

彭腹以決白虎証

者不可不知按腹

在胸脇也。但頭微汗出者大陷胸湯主之○

傷寒發熱汗出不解心下痞鞅嘔吐而下利

者○按之心下滿痛者此為實也當下之○

傷寒後脉沉沉者內實也下解之

白虎湯

治大渴引飲

石膏粳米

煩燥

知母甘草

者

知母六兩

六分

石膏一斤

六分

甘草二兩

二分

米六合

二錢

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升。微汗出者。白虎類與五苓

散亦互有相救之勢審証先與白虎湯而難愈者與五苓乃愈此支飲得除心下開爽而白虎之功見也余知之者曰服文蛤散若不差者與五苓散是又蛤散與五苓散相表裡也文蛤但治渴故準擬以知白虎與五苓相救也治驗亦多

○東洞子曰白虎湯症而心下痞鞭者主之又若渴欲飲水口乾舌燥條曰為則按以上四

升日三服

以水一合二升煮取六升

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒○三陽合病

腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺

尿發汗則譫語止之則額上生汗手足逆冷

若自汗出者○傷寒脉滑而厥者裏有熱也

白虎加人參湯治本方證而心下痞鞭參者

於白虎湯方內加人參二兩

三分

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者

章千金方作白虎湯主之外臺亦用而方後曰傷寒論方今從之

炎暑中昏暴吐瀉惡風汗出而渴此為陽明病治中白虎湯又治四肢厥冷者又治瘧疾服如桂枝湯法加人參湯加桂枝湯皆同

○傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩

欲飲水數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩

背微惡寒者○傷寒脈浮發熱無汗其表不

解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者○

若渴欲飲水口乾舌燥者○太陽中熱者喝

是也汗出惡寒身熱而渴

白虎加桂枝湯治白虎湯證而上衝桂枝者

白虎加桂枝湯

治白虎湯證而上衝桂枝者

於白虎湯方內加桂枝三兩

三分

右以水一斗五升煮取八升去滓溫服○溫
瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼痛煩時嘔

類聚方集覽上

燕客止莊門
 莊客與莊婦
 皆請莊婦歸
 古以庄婦為
 莊主之妻
 莊主之妻
 莊主之妻

類聚方集覽下

日本

南總

雉間煥子炳標注

小承氣湯

男

適之適校

小承氣湯

治腹滿

枳實厚朴

而大便難大者

大黃四兩

一錢二分

厚朴二兩

六分

枳實二枚

九分

已上三味以水四升煮取一升二合去滓分

溫二服

以水二合煮取六分

初服湯當更衣不爾者盡

飲之若更衣者勿服之

也。更衣謂大便下也。

○病後及平日煩
放屁者宜此方

○大滿不通者宜
主大承氣湯外症
雖有微發熱惡寒
乎已稱微亦何拘
拘
○小便清者說見
于桂枝湯標

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短
氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也
手足濇然而汗出者此大便秘已鞭也大承氣
湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其
熱不潮不可與承氣湯若大滿不通者可與
小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○傷寒不
大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便
清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛

○失氣當作矢氣
轉訛也矢與屎通
轉矢氣謂放屁夫
欲用大承氣者先
與小承氣而以轉
失氣為其候者此
或不然且曰攻之
必脹滿者亦不足
信之若用大承氣
有災害者雖小承
氣不當用之此摸
索以冀有偶中者
已蓋僥入也明矣
要之嘗一誤藥而
怯癰為痼者之言

者必衄宜桂枝湯○陽明病潮熱大便微鞅
者可與大承氣湯不鞅者不與之若不大便
六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯
湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若
不轉失氣者此但初頭鞅後必溏不可攻之
攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦
其後發熱者必大便復鞅而少也以小承氣
湯投之不轉失氣者慎不可攻也○陽明病

也非長沙家法且
診燥屎之法詳于
大承氣標
畢竟大小承氣湯
方本同証也若去
消石者譬之鈍刀
遂弗可用已若以
大承氣湯為不可
則當按他方用之
不可忽諸

其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭
則讞語小承氣湯主之若一服讞語止更莫
復服○陽明病讞語發潮熱脉滑而疾者小
承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣
者更服一升若不轉失氣勿更與之明日不
大便脉反微澀者裏虛也為難治不可更與
承氣湯也○太陽病若吐若下若發汗微煩
小便數大便因鞭者與小承氣湯和之愈○

○下利讞語者有燥屎是大承氣湯症

○長沙氏有小承氣湯我未能信之

得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下
鞕至四五日雖能食以小承氣湯少少與微
和之令小安至六日與承氣湯一升若不大
便六七日小便少者雖不能食但初頭鞕後
必溏未定成鞕攻之必溏須小便利屎定鞕
乃可攻之宜大承氣湯○下利讞語者有燥
屎也○大便不通噦數讞語者

厚朴三物湯

治小承氣湯證而腹滿甚

厚朴枳實

而况於厚朴二物湯乎

○東洞子曰此方合厚朴三物湯與挂枝去積藥湯而加生姜二兩方也由是觀之當有方證而上逆嘔吐

倍者

厚朴八兩

二錢四分

大黃四兩

一錢二分枳

實五枚

一錢五分

右三味以水一斗二升先

煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升

以利為度

煮如前方

○痛而閉者

厚朴七物湯

治腹滿

枳實厚朴

發熱

挂枝上逆

挂枝大黃

而嘔者

生姜

厚朴半斤

八分

甘州大黃各三兩

三分

大棗十枚

二分五厘

枳實五枚生薑五兩

各五分

挂枝二兩

二分

○治後世稱膨脹者又大黃合桂枝合芎藭能治衝逆

○按或以甘艸湯為後方可也此長裏相救也曰陽明病不吐不下心煩者調胃承氣湯主之由是知之

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三

服以水一合五嘔者加半夏五合下利去大

黃寒多者加生姜至半斤

病腹滿發熱十日脉浮而數飲如故

大承氣湯

治腹堅滿

厚朴芒消枳實若下利臭穢大黃

芒消若有燥屎大黃者凡有燥屎者臍下必磊

砢也肌膚必枯燥也煥曰以手按腹病人兩

手護之眉皺作楚是也

蕎麥煎法蕎麥捍
為麤末加鹽炒熟
入囊以摩腹上能
令藥力透

大黃四兩

分六

厚朴半斤

二錢

枳實五枚

五厘

芒消三合

分九

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內

大黃煮取二升去滓內芒消更上火微一兩

沸分溫再服得下餘勿服

以水三合煮厚朴枳實減半去滓內

大黃煮取六分

內芒消令消

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短

氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

。所謂治有汗吐
下和之四者蓋本
于茲

宜與小承氣湯標
併觀上條同

手足濇然而汗出者此大便已鞅也大承氣
湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其
熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可
與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○陽明
病潮熱大便微鞅者可與大承氣湯不鞅者
不與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之
法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有
燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞅

○傷寒有燥屎者
外証多如是其機
不可失矣

○醫宗必讀云治
傷寒九日以來口
不能言目不能視體

不能動四肢俱冷六脉皆無以手按腹病人兩手
後必澹不可攻之攻之必脹滿不能食也欲
飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭
而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不
可攻也○傷寒若吐若下後不解不大便五
六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨
語如見鬼狀若劇者發則不知人循衣摸床
惕而不安微喘直視脉弦者生澹者死微者
但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利止

之眉皺作楚跌陽脉大而有方乃知腹有燥屎也遂下之得燥屎六七枚而口能言體能動矣

後服○陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭爾○汗出譫語者以有燥屎在胃中此為風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裡實故也下之則愈○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱熱汗出大便難而譫語者下之則愈○陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必

○此非挂枝湯証
恐挂枝麻黃各半
湯

唐不可攻之若有燥屎者○病人煩熱汗出
則解又如瘧狀日晡必發熱者屬陽明也脉
實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承
氣湯發汗宜挂枝湯○大下後六七日不大
便煩不解腹滿痛者此有燥屎也○以然者
本有宿食故也○病人小便不利大便乍難
乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也○
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩燥心下

○但發熱汗多者
不可妄攻之詩云
戰戰兢兢如臨深
淵如踏薄冰此之

鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微
和之令小安至六日與承氣湯一升若不大
便六七日小便少者雖不能食但初頭鞭後
必溏未定成鞭攻之必溏須小便利屎定鞭
乃可攻之○陽寒六七日目中不了了睛不
和無表裏證大便難身微熱者此為實急下
之○陽明發熱汗多者急下之○發汗不解
腹滿痛者急下之○腹滿不減減不足言當

謂也下條口燥咽乾者亦同焉然大承氣湯証而無之者急下之可也

世醫本恐下劑故以不得盡其劑故雖下利未爽快見其未爽快以為既虛妄與補藥亦何患也除病莫如盡未盡無止後服夫病如火也下星之火咸陽為灰毒之不盡雖少乎不可不除矣

下之○陽明少陽合病必下利其脉不負者

順也負者失也互相尅賊名為負也脉滑而

數者有宿食也當下之○少陰病得之二三

日口燥咽乾者急下之○少陰病自利清水

色純青心下必痛口乾燥者急下之○少陰

病六七日腹脹不大便者急下之○下利三

部脉皆平按之心下鞭者急下之○下利脉

遲而滑者內實也利未欲止當下之○入病

○中風卒倒有因食噉太過者此曰食厥此方主之

○差後至其年月日時復發者何必下利乎諸病或有一例宜深思之初服承氣湯病解能食後更發熱者病未盡故也更與承氣小柴胡湯條有此例宜併觀之

有宿食何以別之曰寸口脉浮而大按之反澁尺中亦微而澁故知有宿食當下之○下利不欲食者以有宿食故也當下之○下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之○下利脉反滑當有所去下之乃愈○病腹中滿痛者此為實也當下之○脉雙弦而遲者必心下鞕脉大而緊者陽中有陰也可以下之○瘕為病胸滿口噤卧不著席腳

○惡露不盡非產後而何刪產後字者記者証也日惡桃仁承氣湯証

○東洞子曰當有心悸証

以下三方善用之應變奏功不可勝計矣風小煩悸手足轉曳惡對人厭煩驚面色時時變志

攣急必齟齬○病解能食七八日更發熱此

為胃實○產後七八日無太陽證少腹堅痛

此惡露不盡不大便煩燥發熱切脉微實再

倍發熱日晡時煩躁者不食食則讖語至夜

即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱也

大黃黃連瀉心湯治心煩黃連大黃心下痞按之

濡黃連者大黃大黃二兩二錢黃連一兩錢

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分

服二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分

癰癤者或酒毒傷食或眼生翳障赤澀流淚或諸疥帶下又諸血症心煩者諸心腹卒痛皆主之

。東洞子曰煎法當從大黃黃連瀉心湯附子瀉心湯之法也又曰不足千金作不定今從之

溫再服

以麻沸湯八勺內藥一沸須臾絞去滓溫服

心下痞按之濡其脉關上浮者○傷寒大下

後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯

攻痞宜大黃黃連瀉心湯

瀉心湯

治心氣不定

黃連黃芩

心下痞按之濡

黃連

黃芩者

大黃二兩

錢

黃連黃芩各一兩

五分

右三味以水三升煮取一升頓服之

○總與上方同而此方為勝
有奇効金瘡並血淋

心氣不足吐血衄血○本以下之故心下痞
與瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不
利者五苓散主之○婦人吐涎沫醫反下之
心下即痞當先治其吐涎沫小青龍湯主之
涎沫止乃治痞瀉心湯主之
附子瀉心湯 治瀉心湯證而惡寒附子者已之
於瀉心湯方內加附子一枚○
右四味切參味以麻沸湯二升漬之須臾絞

去滓內附子汁分溫再服

大黃

錢一黃芩黃連各五分

附子

七分五厘

右四味以水九勺先煮附子取六勺去滓

內諸藥煮一二沸須臾絞去滓服

心下痞而復惡寒汗出者

大黃附子湯

治腹絞痛

附子大黃

惡寒

附子細辛者

大黃二兩

分九

附子三枚

錢一錢五分厘

細辛二兩

分六

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強

胸脇腹偏背滿
腹絞痛至甚身不
可轉側肉厚如磬
坐卧兩不得者治
之如神又曰承氣
漿胡類以此方為

後方或長服承氣

紫胡類之人一日

問服此方而用前

藥乃奏功十倍也

此寒也者謂水

氣凝寒即水氣故

附子治之又細年

治之

六黃甘遂湯服

人煮取二升半分溫三服服後如人行四五

里進一服以水一合五勺煮取六勺脇下偏痛發熱其

脉緊弦此寒也以溫藥下之

大黃甘遂湯 治腹滿如敦狀大黃小便微難

甘或經水不調者

大黃四兩一錢四分甘遂阿膠各二兩七分

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當

下以水一合八勺煮取六勺

經水不調則婦人字不可刪也蓋轉訛

。治諸打撲要劑也。或為末石所壓。或從高墜。若劇則瘀血上攻。心腹實痛。膨脹悶亂。二便不通。或厥冷垂危者。並主之。金匱云。亦治男子膀胱滿急。有瘀血者。蓋此類乎。破傷風者。服之。且

婦人小腹滿如敦狀。小便微難而不渴。生後此為水與血俱結在血室也。

抵當湯

治瘀血凡有瘀血者。二少腹鞭滿小

便快利者。一也。腹不滿其人言我滿者。二也。

煥案健忘者。亦有瘀血急。則以湯緩。則以丸。

水蛭蚘蟲各三十個。耐桃仁二十個。分二大黃

三兩

二錢

右四味為末。以水五升煮取三

升。去滓溫服一升。不下再服。

為末以水一合煮取六分

傳瘡口有効又竹
木刺在肉中者和
飯附瘡口即挺出
又眼目赤疼流淚
痛不可忍者洗之
最妙

○尿雖鞭云云是
患血症之人

太陽病六七日表證仍在脉微而沈反不結

胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小

便自利者下血乃愈乃以然者以大陽隨經

瘀熱在裏故也○太陽病身黃脉沉結少腹

鞭小便不利者為無血也小便自利其人如

狂者血證諦也○陽明證其人喜忘者必有

畜血乃以然者本有久瘀血故令喜忘尿雖

鞭大便反易其色必黑○病人無表裏證發

。為丸主治與浮石丸同
東洞子曰治病不別男子婦人雖然然乎心下痞按之濡與腹不滿其人言我滿者於瘕則同於方則異男子必三黃丸婦人乃浮石丸抵當丸豈必為無異乎。晬時周時也陰症傷寒有熱小腹痛應小便不利

熱七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血○婦人經水不利下

抵當丸 治抵當湯症而緩者

水蛭 蜃 蟲 桃仁 各二十個 大黃 三兩

六錢

右四味杵分為四丸以水一升九煮一九取

七合六分服之晬時當下血若不下者更服○

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為

者反利者宜兼用此方或單用更無餘藥可救其或者傷寒二字緊要也不可刪

橘皮大黃朴消湯中諸魚毒者皆主之又總治宿食在心胸間而不化不限魚毒魚毒久而為癥病者以苦酒飲漿水煮服妙○大黃消石湯當有心煩症治噎噤又平日懊憹者主之或為丸為兼用劑亦可也

有血也當下之不可餘藥

橘皮大黃朴消湯

治胸間有宿滯

橘皮芒消

而結

大者

橘皮一兩

六分

大黃朴消各二兩

一分錢二分

右三味以水一大升煮至小升頓服即消以水

一合八勺煮取六勺

○鱸食之在心胸間不化吐復

不出速下除之久為癥病

大黃消石湯

治發黃

黃蘗梔子

腹中有結塊

大黃消石

者大黃黃蘗消石各四兩八分梔子十五枚

。東洞子曰千金方作牡丹皮三兩瓜子一升芒消二兩瓜子一升當今十兩按便毒與腸癰治相類故便毒未潰者服之可以下之

分四 右四味以水六升煮取三升去滓內消

石更煮取一升頓服

以水一合二勺煮三味取六勺去滓內硝令消

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和

裏實當下之

大黃牡丹皮湯

治臍下有堅塊

大黃芒消按之則

痛

瓜子芒消

及便膿血

挑按者大黃

者

大黃四兩

六分

牡丹一兩

四分

五厘

桃仁五十個芒

消三合

各三分

瓜子半升

一錢五分

奇術也便毒腸癰共不可論膿成與

未成

此方不獨治腸癰

而已專能治無名

惡瘡癰疔腫鬼瘰

瘰癧流注楊梅便毒

及一切有膿者及

淋疾帶下痔漏痢

疾等腫及數年者

皆有奇功

。東洞子曰當有

急迫証

治心腹虫痛加鷓鴣

鷓鴣菜益奇

吐食或因大便秘閉故用大黃

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再

煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血以水

六勺煮取六勺去澤內芒消令消○腸癰者小腹腫痞按之

即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡

寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪

數者膿已成不可下也

大黃甘州湯 治秘閉大黃急迫甘州者

大黃四兩二錢甘州一兩五分

。東洞子曰但拘
急而大便不通者
主之
實者謂堅實有塊
也
凡噦逆家之要妙
也

右二味以水三升煮取一升分溫再服以水合

八勺煮○食已即吐者取六勺

調胃承氣湯

治大黃甘艸湯證而實芒者

大黃四兩

錢一甘艸二兩五分

芒消半觔

錢二

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒

消更上火微煮令沸少少溫服

以水一合八勺煮取六勺

去滓內芒
消令消

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣

此症而用桂枝湯
非醫人哉為誤者
昭昭然曰得之便
厥其然

○一切牙齒疼痛
者加黃連服之大
有奇効及小兒疳
蟲蝕齒或至色黑
者亦加黃連用之
不日者之消至朽
盡夫世醫用之切
口病多因胃熱者
不可謂然也調胃
者蓋疏滌胃中熱
毒之謂乎病人面熱亦胃熱也宜此方加黃連亦可也
若甘姜味辛夏仁

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥
咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾姜湯與之以
復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘艸湯與
之其脚即伸若胃氣不和讖語者少與調胃
承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之
○發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實
也當和胃氣○太陽病未解陰陽脉俱停必
先振慄汗出而解但陽脉微者先汗出而解

黃湯條有微宜併觀

○陽明病不吐不下心煩譫語燥屎等傷寒用此方之樞要也但曰大黃甘艸湯証而實者於是後生或惑故云爾又主痢疾

但陰脉微者下之而解若欲下之○傷寒下三日不解過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞫而反下利脉調和者知醫以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此為內實也○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反澹腹微滿鬱鬱微煩无此時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲嘔胸

○日數固_不拘然_太陽病三日者但變為陽明病之稱也故曰屬胃也不然則但有桂枝証

○小腹急結者有三焉長則帶急迫者二則無逼迫但小腹結實而有塊耳赤白帶下主之並痢疾打撲瘀血者小腹急結有塊者男子亦宜此方。產後百疾莫神於此方之神焉善會

中痛微瀉者此非柴胡證以嘔故知極吐下也○陽明病不吐不下心煩者○太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也○傷寒吐後腹脹滿者○大便不通胃氣不和者

挑核承氣湯

治血證

挑核大黃

小腹急結

大黃芒消上

衝枝者

挑仁五十個桂枝芒消甘草各

二兩

各五分

大黃四兩

錢一

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消

此術則產論及其它方法皆可以覆醬瓿，催生亦至妙。又經水之變皆

更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利。以水一合五勺煮取六勺去滓內芒消微沸令消

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下

者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解

已但小腹急結乃可攻之

下瘀血湯 治臍下毒痛

桃核廣虫

及經水不利黃太

廣者

大黃二兩

四錢

桃仁廣虫各二十枚

。乾血著臍下故其痛不可忍是以稱毒痛又因經水之變治打撲功次于抵當湯凡攻瘀血劑

皆治打撲，若無蟻蟲以蜜代之。

桂合破血劑能助其功，是治衝逆之餘力也。一味土瓜根以苦酒煮服，治經水不利者。陰癰腫者，陰囊腫大及陰莖腫脹，或水疱光澤是也，小兒亦同。

丸取八合，頓服之。新血下如豚肝，以酒八勺煮一丸取六〇產婦腹痛，法當以枳實芍藥散，假令不愈者，此為腹中有乾血著臍下，宜下瘀血湯主之，亦主經水不利。

土瓜根散 治少腹拘急，芍藥經水不利，桂枝土瓜根或下白物。廣者

芍藥、桂枝、蟻蟲、土瓜根各三分。

右四味杵為散，酒服，方寸匕，日三服。

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者

陰癰腫

甘州湯 治逼迫及咽喉急痛者

甘州二兩錢二

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七

合日二服以水一合二○少陰病二三且咽

痛者可與甘州湯不差者與桔梗湯

桔梗湯 治甘草湯證而有膿或粘痰者

○東洞子曰粘痰如膿者主之

○一本治下有病字○東洞子曰甘州主急迫也甘州湯五苓散一方善知運用之妙則與諸方相表裡而有再快功也

按金匱再服下有
則排膿血也五字

○東洞子曰有粘
痰或膿血而急迫
者主之
按排膿散排膿湯
二方排膿字足以知其主治故略其症乎又桔梗湯下欬而胸滿振寒

桔梗一兩錢 甘艸二兩錢

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

以水一合八勺○少陰病二三日咽痛者可與

甘艸湯不差者○欬而胸滿振寒脉數咽乾

不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為

肺癰

排膿湯 治膿血桔梗及粘痰生薑急迫甘艸者大棗

甘艸二兩錢 桔梗三兩錢 生薑一兩四分 大

條即排膿湯症也用之大勝桔梗湯

棗十枚

錢一

右四味以水三升煮取一升

溫服五合日再服

以水一合八勺煮取六勺八

芍藥甘草湯

治拘攣

芍藥

急迫

甘草

者十二升

芍藥甘草各四兩

錢二分

右二味以水三升煮取一升半去滓分

溫再服之

以水一合二勺煮取六勺

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒肢攣

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥

○見于調胃承氣湯標

。凡腹弦急按之不撓者主之治腹痛雖然亦宜因其腹症

東洞子曰芍藥
甘艸湯加減之方
也故當有變急症
煥按當有嘔症此
方主水病曰雖利
心下續堅滿者下
利而腹空故過身
水氣直飯心下也
續與此湯續得下
利水氣盡而愈故
曰此為留飲欲去

咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾姜湯與之以

復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘艸湯與

之其腳即伸若胃氣不和讖語者少與調胃

承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

甘遂半夏湯 治芍藥甘艸湯證而心下鞭滿

嘔甘遂者

甘遂三枚

二分半夏十二枚錢一

二分芍藥五枚甘艸指大一枚

各八分

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半斤

和藥汁煎取一合頓服之

以水一合六勺煮取四勺去滓以蜜

四勺和藥汁煎取六勺

○病者脉伏其人欲自利利反

快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也

芍藥甘草附子湯

治芍藥甘草湯證而惡寒

附者

芍藥甘草各三兩

二錢

附子一枚

六分

已上三味以水五升煮取一升五合去滓分

溫服

以水二合煮取六勺

發汗病不解反惡寒者虛故也

○發汗不解反惡寒此所謂風氣去濕氣在也

○藏躁之藏與藏
堅癢之藏同此陰
中急躁色慾妄動
也兼以狂疾者服
此方如神故吉子
於此獨不刪藏字
可謂得矣弗可容
易看過

○粉之說紛紛誰
知其是非然余謹
案是甘艸粉也何
則吐涎虫此是
病危篤欲絕之時
多有焉急迫至劇
者也心痛所謂朝發夕死夕發朝死非藥力不及是也且曰毒藥不止言

甘麥大棗湯

治急迫

甘艸而狂驚小麥者

十九

甘草三兩

四分五厘

小麥一升

二分四厘

大棗十枚

四分

右三味以水六升煮取三升分溫三服

以水一合

二勺煮

婦人

藏躁喜悲傷欲哭象如神靈

乃作數欠伸

乃六

甘艸粉蜜湯

治吐涎吐虫心痛發作有時者

甘艸二兩

二錢

粉一兩

一錢

蜜四兩

四錢

右三味以水三升先煮甘艸取二升去滓內

者也心痛所謂朝發夕死夕發朝死非藥力不及是也且曰毒藥不止言

雖剛烈之藥不能治之而此方能救之亦何神也急食甘以緩之之謂也其如是故一味甘草者汁而不足再內甘草粉又內蜜以助其藥勢而後始有糜西日之力焉其他稱溫扶白粉而此但曰粉且受于甘草下故余知之不啻以此知之而已經驗無算故居恒每戲云當死者我能使之起勿謂余誕又按甘草一名粉草者蓋本于斯反可以為微

粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止以水

九勺先煮甘草取六勺去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥

蛇蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥

不止

生姜甘草湯 治欬唾涎沫不止生薑大棗心下痞

硬參急迫甘草者

生薑五兩錢一人參三兩六分甘草四兩大棗十

五枚各八分

也

。生姜甘艸湯東

洞子曰當有心下

痞鞭強急之症

。甘艸乾姜湯京

洞子曰當有急迫

之証

治久痢後用承氣

丸

四逆輩本出于此

方而卻為四逆之

後方有再快之功

焉

大率急卒逆冷者

宜此方大病在胃

不差而厥冷者宜四逆輩矣

右四味以水七升煮取三升分溫三服

肺痿。欬唾涎沫不止咽燥而渴

甘草乾姜湯

治厥而煩躁

甘艸多涎唾乾姜者

甘草四兩

錢乾姜二兩

五分

右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫

再服

以水一合二勺煮取六勺

肺痿。吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小

便數。所以然者以上虛不能制下故也此為

○前凡于芍藥甘草湯及調胃承氣湯

肺中冷，必眩，多涎唾。甘草乾姜湯以溫之。若服湯已，渴者屬消渴。○傷寒，脈浮，自汗出，小便數，心煩，微惡寒，腳攣急，反與桂枝湯欲攻其表，此誤也。得之便厥，咽中乾，煩躁，吐逆者，作甘草乾姜湯與之，以復其陽。若厥愈足溫者，更作芍藥甘草湯與之，其腳即伸。若胃氣不和，讖語者，少與調胃承氣湯。若重發汗，復加燒鍼者，四逆湯主之。

東洞丁口此方

甘州君藥也

乾姜治結滯之水

毒故傍治小便清

利

清穀之清與圖通

者鑿也言穀食不

化無臭穢故曰清

穀也小便清利亦

爾言飲而直尿且

色不變也

如葱白大有驗

四逆湯

治四肢厥逆

甘草

身體疼痛附子下利清

穀

附子甘草

或小便清利

甘草

者

甘草二兩

一分錢

乾姜一兩

半附子一枚

各九分

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓

分溫再服強人可大附子一枚乾姜三兩以水

一合五勺
煮取六勺

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒腳攣

急反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥

○說見于調胃承氣湯

○說見于桂枝湯

病發熱以下反麻黃湯症已但曰

咽中乾煩躁吐逆者作甘艸乾姜湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譫語者少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之○傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○病發熱頭痛脉反沉若不差身體疼痛當救其裏○

脉沉為四逆湯症
藥可從

。當吐之者宜服
瓜蒂散上文皆瓜
蒂症故知之

脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者○利不渴
者屬大陰以其藏有寒故也當溫之宜服四
逆輩○少陰病脉沉者急溫之○少陰病飲
食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐如得
之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當
吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫
之○大汗出熱不去內拘急四肢厥又下利
厥逆而惡寒者○大汗若大下利而厥冷者

嘔而脉弱云云條皆舉証之相反者也其為難治實然然空論也不足以為據

末二條皆霍亂病且最末條恐通脉四逆湯

此方乾姜君藥也乾嘔不止者加梗米

○下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏四逆湯攻表桂枝湯○嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治○吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者○既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者

通脉四逆湯

煥案治前方證而乾嘔

倍加乾姜者

甘艸二兩

錢一附子一枚

七分五厘

乾姜三兩

一錢六分

○東洞子曰當作附子大者一枚以干姜知其然甘草新校正作二兩是也
加減法不足信之身反不惡寒以下二十六字亦撓入

加葱白大有驗不拘面色

裏寒外熱外寒裏熱之術治陽寒少陰症及下利之緊要不可不知說具

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其脉即出者愈後加減法面色赤者加葱九莖腹中痛者去葱加芍藥一兩嘔者加生姜二兩咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩煮如本方
少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者○下利清穀裏

于白虎湯標

○東洞子曰當有
心下輕病也辨之
藥徵人參條下

○東洞子曰當有
心下悸惡寒症
按案當曰四逆加
人參湯症而悸者

寒外熱汗出而厥者

四逆加人參湯

治四逆湯證而心下痞鞭

人參

者

於四逆湯方內加人參一兩

甘草

乾姜附子

各七分五厘

人參

五分

右四味煮如本方

惡寒脉微而復利利止亡血也

茯苓四逆湯

治四逆湯證而悸

茯苓者

茯苓六兩

一錢五分

人參一兩

二分五厘

甘草二兩

五分

恐是脫字又按此條方證似不相對

○若無猪膽代以水銀或鈆丹或黃金水印有効

已上數方中此方

最如神篤志者記

之
漫驚風危篤者主

乾姜一兩半附子一枚各三分八厘

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合

日三服以水一合煮取六分

發汗若下之病仍不解煩躁者

通脉四逆加猪膽汁湯 煖案四逆湯證而煩

躁猪胆者 於四逆湯方內加猪膽汁半合

如無猪膽以羊膽代之○吐已下斷汗出而

厥四肢拘急不解脉微欲絕者

○當有下利煩躁

惡寒証

此方書曰煩躁夜

則安眠者實能治

之大奇也

乾姜附子湯

煖案治下利

附子乾嘔者

乾姜一兩

二分錢

附子一枚

一分錢

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

以水合

八勺煮取六勺

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜

不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者

附子粳米湯

治腹中雷鳴

半夏切痛

附子或大棗

嘔吐

半夏粳米者

附子一枚

三分半夏半錢

甘

寒氣水氣也

○東洞子曰當有

惡寒或浮腫症

煖曰主諸水氣者

又曰此散顯然如

成何一日三用之

為治然顯然甚

又曰此方為諸烏

頭劑後方○緩急亦水氣之變也緩猶痿謂痿弱不可舉也急若攣急

艸一兩二分大棗十枚五分梗米半升二錢

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服以水一合六勺煮取六勺

服中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

薏苡附子散 治胸中痺薏苡附子惡寒附者

薏苡仁十五兩大附子十枚等分

右二味杵為散服方寸匕日三服

胸痺緩急者

胸痺緩急者

○此方亦主水氣之變
腹無積聚四字於方極為刺語恐記者訛也

○東洞子曰當有氣逆証

薏苡附子敗醬散 治一身甲錯附子腹皮急

附按之濡如腫狀薏苡附子腹無積聚者

薏苡仁十分附子二分敗醬五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半

白頓服小便當下以水一合二勺煎減半

腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫

狀腹無積聚身無熱脉數此為腸內有癰膿

白通湯 煥案治乾嘔干姜下利附子而頭痛葱白

當有惡寒症
干姜附子湯症而
頭痛氣逆者主之

葱白四莖二錢 乾姜一兩 附子一枚

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

以水一合八勺煮取六勺 少陰病下利脉微者

自通加猪膽汁湯 煖案治白通湯證而厥逆

附子乾嘔乾姜猪胆煩躁劇人尿猪胆者

葱白四莖 乾姜二兩 附子一枚 人尿

五合 猪膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁

○葱白倍用可也
上方同
今代人尿以水銀
有効黃金水亦可
也

○日服湯脉暴出者死實爾實爾不獨此方爾諸厥逆脉伏者服湯後微續漸出者壽兆也

○強人弱人異服度者弗可謂無也亦何剛乎烏頭桂枝湯曰初服二合云云烏頭湯曰不知盡服之皆謹之至也執七之間莫本諸

人尿和令相得分温再服若無膽亦可用

水以

一合八勺煮取六勺和人尿胆汁服少陰病下利脉微者與

白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加

猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者生

大烏頭煎 治毒繞臍絞痛或自汗出手足厥

冷者 烏頭大者五枚

三錢

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令

水氣盡取二升強人服七合弱人五合不差

○刪腹病字者亦記者訛也

已下二方若輕病則去蜜水煎服亦可也

○東洞子曰當有自汗盜汗浮腫症

烏頭湯

○燬曰以上二方

與烏頭桂枝湯大

同小異譬如伯仲其救濟之妙不可勝數矣如略說見于烏頭桂枝湯標

明日更服不可一日再服以水九勺煮取三勺去滓內蜜六勺

煎取○腹痛脉弦而緊弦則備氣不行即惡

寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝遠

臍痛若發則自汗出手足厥冷其脉沉弦者

烏頭湯 治骨節疼痛不可屈伸烏頭看自汗

黃耆或盜汗黃耆若腹絞痛烏頭者

麻黃芍藥黃耆甘州各三兩六分川烏五枚炮

咀以蜜二升八分煎取一升四勺即出烏頭

好古之士勿失其機。病歷節者每節皆患也。非惡辭之例刪之者記者。誰也。攻五藏者言病勢盛而遍于腹內也。

。東洞子曰當有心下悸及嘔而腹痛症與諸麻黃劑相表

右五味以咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中夏煎之服七合不知盡服之。以水七勺煮四味取九勺去滓內蜜煎中夏煎取六勺。

病歷節不可屈伸疼痛。胸氣疼痛不可屈伸。寒疝腹中絞痛。賊風入攻五臟拘急不得轉側。發作有時使人陰縮手足厥逆。

赤丸治心下悸。夜有痰飲。細辛惡寒。子或微。

厥細辛者。茯苓四兩半夏四兩。一方用桂四兩。

裡也宜為後方于
 金方發汗圓加大
 附子一名神丹湯
 神丹與直朱同所
 謂神丹其遂之神
 丹是也以知為度
 謂腹眩也寒氣水
 氣也
 宜煎家附子湯
 同
 治一食一行者附
 子湯同

烏頭二兩細辛一兩

右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大

先食酒飲下三九日再夜一服不知稍增之

以知為度○寒氣厥逆

真武湯治心中躁疾身攣動疾振振欲擗地

附子小便不利疾或嘔疾若下利附子若拘

痛附子者疾芍藥生薑各三兩七分五厘

朮二兩五分附子一枚四分

○加減法及其人
或咳以下十四字
不足信之

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合

日三服

以水一合六勺煮取六勺

後加減法若效者加五

味半升細辛乾姜各一兩若小便利者去茯苓

苓若下利者去芍藥加乾姜二兩若嘔者去

附子加生姜足前成半斤

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不

利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣其

人或欬或小便利或下利或嘔者○大陽病

發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身

潤動振振欲擗地者

附子湯 治身體攣痛附子小便不利木心下

痞鞭人若腹痛芍藥者

附子二枚茯苓芍藥各三兩六分人參二兩四分

朮四兩八分

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升

日三服以水一合六勺煮取六勺○少陰病得之一二日

東洞子曰嘗有
心下悸小便不利
或痞鞭症藥徵辨
之
真武湯與此方太
同小異筋惕肉瞤
等症宜互相通用
○金匱要畧下云
婦人懷妊六七月
脉弦發熱其胎愈
服腹痛惡寒者小
腹如扇所以然者子藏閉故也當以附子湯溫其藏

○天雄散東洞子曰失精家而小便不利臍下有動或惡寒或上逆者主

之藥微有辨案藥微據本草附

方為說曰挂枝加

龍骨牡蠣湯條蓋

脫天雄散亦主之

六字此說實然然

彼主陰常強急此

方則主陰痿且大

有膜眩一錢七日

三服惡不可也

天雄即附子

宜與挂枝加龍骨

牡蠣湯條參觀

○東洞子曰集註

曰舊本有一服得

口中和其背惡寒者當灸之○少陰病身體

痛手足寒骨節痛脉沉者

天雄散 治小便不利 上逆 臍下有動 龍

而惡寒 附者 天雄二兩當作三枚 木八

兩挂枝六兩龍骨三兩

右四味杵為散酒服半錢七日三服不知稍

增之 半錢七 日三服

梔子豉湯 治心中懊懣者

梔子十四枚分八香豉四合二錢

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉

煮取一升半太滓分為二服溫進一服得吐

者止後服以水一合六勺先煮梔子取一合去滓內豉煮取六勺

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛

倒心中懊懣○發汗若下之而煩熱胸中窒

者○傷寒五六日大下之後身熱不去心中

結痛者未欲解也○陽明病脉浮而緊咽燥

旺者止後服七字此因瓜蒂散中有香豉而誤傳於此今為刪正余亦從之以下倣之案懊懣多在太病差後回過食而發故服湯乃得吐而解大病差後食已胸中微煩昏沉者主之反覆顛倒者煩躁不眠不能安卧床之甚者也結痛亦是差後過食故已

惡熱身重以上
誤藥發懊懣者
之初證也何必為
獨不可拘焉

下利後條或為上
條虛煩注文而可
乎不如刪之

口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身
重若發汗則燥心憤憤反讖語若加燒鍼必
怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣
動膈心中懊懣舌上胎者○陽明病下之其
外有熱手足溫不結胸○心中懊懣饑不能食
但頭汗出者○下利後更煩按之心下濡者
為虛煩也

梔子甘艸豉湯 治本方證而急迫
草者

少氣者與短氣有微飲之短氣同

○東洞子曰已上二方証以若字者冠扼子豉湯證之辭今裂而列之故敢加扼子豉湯証而六字以通其意也

○枳實扼子豉湯東洞子曰當有心中懊懣胸滿症

於扼子豉湯方內加甘草二兩分

扼子豉湯證而若少氣者

扼子生姜豉湯 治本方證而嘔生者

於扼子豉湯方內加生薑五兩錢二

扼子豉湯證而若嘔者

枳實扼子豉湯 治本方證而胸滿枳實者

枳實三枚分六扼子十四枚分四豉一升二錢

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實

懊懣與胸滿或為
難別乎按此心中
鞭滿若熱痛耳
以上四方粗無大
異大概皆主差後
宿食而獨此方為
最勝然不加黃
者不足以立功

梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分

再服覆取微似汗以水一合六勺先煮二味取八勺下豉煮取六勺

大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有

宿食者加大黃如博碁子大五六枚

梔子大黃豉湯治枳實梔子豉湯證而閉黃大

者梔子十二枚二分大黃一兩一分枳

實五枚七分豉一升八分錢

右四味以水六升煮取二升分溫三服以水一合

已熱痛、蓋懊懣劇者、

八勺煮取六勺

○酒黃疸心中懊懣或熱痛

茵陳蒿湯

治一身發黃

茵陳大便秘難黃者

茵陳蒿六兩八錢梔子十四枚大黃二兩

各六分

右三味以水一斗先煮茵陳減六升

內二味煮取三升去滓分溫三服

以水二合先煮茵陳

取一合二勺內二味煮取六勺小便當利尿如皂角汁狀色

正赤一宿腹減黃從小便去也

穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安

○刺讀為齊，蓋古齊與刺通，故轉訛已。

久久發黃為穀疸。陽明病發熱汗出，此為

熱越，不能發黃也。但頭汗出身無汗，刺頸而

還，小便不利，渴引水漿者，此為聚熱在裏，身

必發黃。傷寒七八日，身黃如橘，小便便

不利，腹微滿者，三長半煮取一升半，分

梔子蘘皮湯。治身黃。蘘皮發熱心煩。梔子者

梔子二十五個一錢五分 甘艸一兩五分 黃蘘二兩

錢。右三味以水四升煮取一升半，去滓分

亦治發黃兼用承氣丸

溫再服

以水一合六勺煮取六勺

○傷寒

身黃發熱者

梔子厚朴湯

治心煩

胸腹滿

厚朴者二兩

梔子十四枚

分六

厚朴四兩

枳實四枚

各一錢

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分

三服溫進一服

得吐者止

後服

以水一合四勺煮取六勺

傷寒亦後心煩腹滿卧起不安者

梔子草

緩湯

治心

中微煩者

梔子者一兩

梔子十四枚乾姜二兩

各一錢五分

梔子者一兩

○主_九真心痛

凡病勢盛者宜從

甘遂

此方與梔子豉湯

茵陳蒿湯輩為表

裡大有得快之功

焉其他或為廢用

後方亦得矣下方

亦同余常為兼用

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二

服溫進一服得吐者止後服以水一合四

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者

大陷胸湯治結胸大黃甘遂若從心下至小腹

鞭滿大黃甘遂者

大黃六兩九分芒消一升三錢甘遂一錢五厘

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內

芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利

所以得効者以芒消量多故也喜方

者思諸

若結胸者復以

蕎麥稗屎其心腹

法見于大承氣湯

標

○若不結胸以下

茵陳蒿湯証也故

知與此方有表裡

之勢因以此方為

後方

止後服

以水一合八勺先煮大黃取六勺去滓內芒消令消內甘遂末服之

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱動

則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反

惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內

拒痛胃中空虛客氣動膈短氣燥煩心中懊

懣陽氣內陷心下因硬則為結胸天陷胸湯

主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而

還小便不利身必發黃也傷寒六七日結

○刪但結胸已下者恐不可若刪之則非矣陷胸湯証。世有肩背急痛而俄死者急用之可以救之此所謂真心痛而見痛微肩背者已不急治之則氣發不待夕夕發不待朝者也病人中覺肩背痛者無他營獨胸中病沉結則偏覺脊脊苦痛也其初以大陷胸在症日結胸者項亦強知之因救肩背急痛者甚多

胸熱實脉沉而緊心下痛按之石鞮者○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者○太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹鞭滿而痛不可近者○傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已

○治真心痛

無葶藶以大戟代

之

按白蜜二合水二

升此蜜為十分之

一也以水一合二

勺準之則蜜一勺

二撮也故曰蜜下

為強或謂強水濕布水

拉撰哉。幾用蕎麥

下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解
若心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯
主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之

宜半夏瀉心湯

大陷胸丸

治結胸

杏仁甘草

若項背強

葶藶大黃芒消

大黃半斤

八兩

葶藶半升

六兩

芒消半升

十兩

杏仁

半升

六兩

右四味擣節二味內杏仁芒消

合研如脂和散取如彈丸一枚別擣甘遂末

為強或謂強水濕布水拉撰哉。幾用蕎麥

○實有心煩症

治心痛

有滑涎急痛後死

者主之說諸于大

陷胸湯據

一錢七白蜜二合今一水二升二合煮取一

升六溫頓服之一宿乃下如不下更服取之

為效禁如藥法

結胸者項亦強如柔痙狀下之則和

小陷胸湯治小結胸者病正在心中按之痛煩悸而嘔者

黃連一兩四分半夏半升二錢枳實大者一

個八分右三味以水六升先煮枳實取三

升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服以水

○結胸病正在胸

中不在心下心中恐轉訛當作心中恐轉訛

五苓散標注宜併

觀曰亦可服與他

稱亦主之者一例也

○治心痛

枳實一兩以白

煎為膏服之治

喘息效陸者

一合八勺先煮枳實取九勺肉二味煮取六勺

小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者○

病在陽應以汗解之反以冷水瀝之若灌之

其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲

飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓

散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白

散亦可服

枳實薤白白酒湯

治胸背痛

枳實薤白白酒

喘息

咳唾括萆薢白者 括萆薢實一枚六分薤白半

升二錢四分白酒七升二合

右三味同煮取二升分溫再服取六分服

胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沉

而遲關上小緊數

括萆薢白半夏湯 治前方證而嘔半夏者

括萆薢實一枚六分薤白三兩九分半夏半升一錢八分

白酒一斗三合

○東洞子曰當有嘔或胸腹鳴症

真心痛

東洞子曰當有

欲吐症

謹案曰治溫溫欲

吐者此本于四逆

湯條實是瓜蒂症

然但曰溫溫欲吐

而已瓜蒂之功豈

盡於此哉

真心痛真頭痛及

產後鬱冒忽暈絕

者並胸痺皆主之

或舌疽或結毒入

眼及黃疽耳鳴又瘧疾骨蒸若下切痼疾結在上部而胸中滿者皆宜此方

右四味同煮取四升溫服一升日三服同上
胸痺不得卧心痛徹背者

瓜蒂散 治溫溫欲吐者

瓜蒂赤小豆各一分五分

右二味各別搗篩為散已合治之作一錢匕

以香豉一合二分錢用熱湯七合七煮作稀糜

去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得

快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

又大頭痛有時發者發時即服之有效。凡服瓜蒂從三分至五分不宜多服已須臾以烏羽或紙繩徐徐摩拂咽中以挑促其吐可也。又曰亡血家大禁之然產後暈倒者此瘀血逆攻也改服此方。病人手足云云條恐不必此方所主也戒慎蓋在此間曰吐方之賢於瓜蒂者有青橘散在詳于類聚方後編。○文蛤散說見于五苓散標注。

病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此為胸有寒也當吐之。○病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸中心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之。○宿食在上脘當吐之。

文蛤散

治渴者

文蛤五兩

錢十

右一味為散以沸湯和一錢七服湯用五合病在陽應以汗解之反以冷水濯之若灌之

其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲
飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓
散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯百
散亦可服○渴欲飲水不止者

大半夏湯

治嘔吐

半夏
蜜

而心下痞鞭

人參者

半夏二升

二錢四分

人參三兩

三分

白蜜一升

二錢五分

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十

遍煮取二升半溫服一升餘分再服

以水三
合四升

○東洞子曰外臺
云嘔心下痞鞭者
今從之
胃反之病因急結
故大便秘閉秘閉
故吐逆不止若服
蜜則急結愈大便
通而後嘔吐得止
○千金方云治胃反不受食食入即吐者

煮取六勺○胃反嘔吐者

小半夏湯 治吐而不渴者

半夏一升二錢四分 生姜半斤一錢六分

右二味以水七升煮取一升半分溫再服以水

二合八勺煮取六勺○哕家本渴渴者為欲解今反不

渴心下有支飲故也○黃疸病小便色不變

欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者

○諸嘔吐穀不得下者

○黃疸病條恐方證不相對

○此與半夏厚朴湯同病然云咽中如有多癰者毒結著于咽中僅為有小異

憤憤心亂也

生姜半夏湯 治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

噦心中憤憤然無奈何者

半夏半升錢三生姜汁一升四

右二味以水三升煮半夏取二升內生姜汁

煮取一升半小冷分四服日三夜一嘔止停

後服以水一合二勺煮半夏取六勺

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

心中憤憤然無奈元一

大抵此證
叶某曰

小半夏加茯苓湯 治小半夏湯證而眩悸者

者 半夏一升一錢 生姜半斤一錢 茯苓

三兩四分 五兩一分

右三味水七升煮取一升五合分溫再服

二合八分 煮取六分 ○卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸

者○先渴後嘔為水停心下此屬飲家

半夏苦酒湯 治咽中生瘡音啞半夏 苦酒者

半夏十四枚五分 雞子一枚去黃

○瘡瘡間有此證
半夏一錢卵一枚
醋一杯煎二三沸
少少嚥之

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去滓少少含嚥之不差更

作三劑

少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者

半夏厚朴湯

治咽中如有炙臠

半夏或嘔生

或心中悸

茯苓

半夏一升

二錢

厚朴三兩

三分茯苓四兩

四分

生姜五兩

五分

乾蘘葉二兩

二分

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三

○東洞子曰實有
悸症又案千金作
胸滿心下堅咽中
帖帖如有炙肉吐
之不出吞之不下
案帖帖結著貞
宜與近方四七湯
併考且其方正同
又加桔梗枳實益可也又代蘇葉以蘇子尤可

或加伏龍肝可
又為兼用劑

○東桐子曰當有
心下痞證証
或三味水煎令生
姜汁服或加伏龍
肝

夜一服

以水一合五
勺煮取六勺

○婦人咽中如有炙蠶

半夏乾姜散

治乾嘔

干姜吐涎沫
干姜者

半夏乾姜各等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半一合

煎取七合六勺頓服之○乾嘔吐涎沫

乾姜人參半夏丸

治嘔吐

干姜
半夏不止生美心

下痞鞭

人參者

乾姜人參各一兩

七份五厘半夏二兩一錢五分

或為無用方

此方之功專在妊

婦則妊娠二字不

可刪世醫多識妊

婦用半半見者不

通之王也非生物

無功又曰一味半

夏末服之治此症

二陳湯亦同

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲

服十九日三服○妊娠嘔吐不止

半夏瀉心湯

治心下痞鞭

參腹中雷鳴

半夏干姜

者

半夏半升

分

黃芩乾姜人參甘草各

三兩大棗十二枚

各四分
五厘

黃連一兩

一分
五厘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三

升溫服一升日三服

以水二合煮取一合二
去滓再煎取六分

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以

○半夏瀉心湯東
洞子曰嘔而腸鳴
下心下痞當作心
下痞鞅
雷鳴因水氣也

○東洞子曰當有
急迫症

他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖
已下之不為逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而
解若心下滿而鞅痛者此為結胸也大陷胸
湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與
之○嘔而腸鳴心下痞者

甘草瀉心湯 治前方證而心煩不得安

甘
州者

半夏瀉心湯方內加甘州一兩

一分
五厘

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀

○孤惑病蓋狂証也此症或為烏梅開鵲鳴米湯症半蝕於喉者喉痺之類蝕於陰者肛門之疾

○以上三方積聚家亦為要方

不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞭也○孤惑之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不得飲食惡聞食臭其面自乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲喝

生姜瀉心湯

治半夏瀉心湯證而嘔

生者

半夏瀉心湯方內減乾姜二兩加姜四兩

半夏九分甘草人參大棗黃芩各四分黃連五厘

乾姜各五分生薑六分

右八味煮如半夏瀉心湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噦

食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

吳茱萸湯治胸滿吳茱萸心下痞鞭人參而嘔生

者一錢吳茱萸一升八分人參三兩大棗十

○按心下痞鞭噦而胸滿腹拘急者專主之治小兒平生頻吐

白沫者

得湯反劇者宜厚

朴生姜半夏甘草

人參湯此再快方

也恐脫文

少陰病條方症不

相對此四逆湯症

乎

東洞子曰當有

吐逆証

二枚

各四分
五厘

生姜六兩

九分

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合

日三服

以水二合一
勺煮取二六勺

○食穀欲嘔者屬陽明

也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也○

少陰病

吐利手足厥冷煩躁欲死者○乾嘔

吐涎沫頭痛者○嘔而胸滿者

厚朴生姜半夏甘草人參湯

治胸腹滿

厚朴
人參

而嘔

半夏
生薑

厚朴生姜各半斤

一錢
二分半

○東洞子曰當有心中悸心煩上逆症一

解醒

夏半升分九人參一兩一分五厘甘草二兩三分

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

日三服以水二合煮取六分○餐後腹脹滿者

黃連湯治心煩黃連心下痞人參欲嘔吐半夏上

衝桂枝者黃連甘草乾姜桂枝各三兩大棗

十二枚各四分五厘人參二兩三分半夏半升九分

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升

日三服夜二服以水一合煮取六分○傷寒胸中有熱

胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

乾姜黃連黃芩人參湯 治心煩黃連黃芩心下痞

鞭人吐干姜下黃連者

乾姜黃連黃芩人參各二兩五分

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

以水一合八○傷寒本自寒下醫復吐下之

寒格更逆吐下若食入口即吐

大建中湯 治腹中大痛膠飴嘔不能食干姜人參

或為發用方

東洞子曰此方主心中煩悸及心下痞鞭而吐下者胃反者主之也

吐蛇

腹皮起如有頭足

膠飴
蜀椒者

蜀椒二合

六分

乾姜四兩

一分

人參二兩

六分

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一

升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可

飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

以水
一合

六勺煮取八勺太滓
內膠飴煮取六勺

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮

起出見有頭足上下痛而不可觸近

○皮起出見者因
腹中有虫也

或云此方云芍藥

治淋家心煩而小便不利者

治痢

阿膠雞卵二味微火煎為膏服之治心煩而不得眠者

○東洞子曰當有心下痞腹強急症

黃連阿膠湯

治心中悸而煩

黃連黃芩不得眠阿膠

桂枝雞子黃

者黃連四兩

二錢

黃芩一兩

三分芍藥

二兩六分雞子黃二枚

一枚

阿膠三兩

九分

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內

膠烱盡少冷內雞子黃攪令相得溫服七合

日三服

以水合半煮三物取六分去滓內膠烱盡少冷內雞子黃攪令相得

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧

黃芩湯

治下利黃芩腹拘急

芍藥者

下痢加禹餘糧大
有即功其他下痢
藥宜加禹餘糧

黃芩三兩大棗十二枚

各九分

甘草芍藥各二

兩

六分

右四味以水一斗煮取二升去滓溫

服一升日再夜一服若嘔者加半夏半升生

姜三兩

以水二合煮取六分

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者黃芩加半夏生薑湯主之

黃芩加半夏生薑湯

治本方証而嘔

生薑半夏

於黃芩湯方內加半夏半升生薑三兩

黃芩大棗生薑

各四分
五厘

甘州芍藥

各三分
半

夏

分九

右六味煮如黃芩湯

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔

者○乾嘔而下利者

六物黃芩湯

治心下痞鞭

人參乾嘔干姜

下利

○東洞子曰當有
心下痞鞭症

黃芩
大棗
上衝

挂
技者

黃芩人參乾姜各三兩大棗十二枚

各四分
五厘

桂枝一兩

分
五厘

半夏半升

分九

說見于小柴胡湯標

右六味以水七升煮取三升分溫三服以水一合

六勺煮取四勺○乾嘔下利

三物黃芩湯 治心胸苦煩者

黃芩一兩四分 苦參二兩八分 乾地黄四兩一分六分

右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐

下魚以水一合八勺煮取六勺

婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但煩者

○東洞子曰當有
心悸症一本作白
頭翁三兩

○東洞子曰雖曰
產後非唯言產後
也當以血證為準
又當有急迫症
按曰非唯言產後
者然然產後下利
者服之亦殊有効

白頭翁湯

治熱利下重

白頭翁
秦皮

心悸

黃連
黃蘗

者

白頭翁二兩黃連黃栢秦皮各三兩

各七分
五厘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升

不愈更服一升

以水二合
煮取六分

熱利下重者○下利欲飲水者以有熱故也

白頭翁加甘草阿膠湯

治前方證而有血證

阿膠
急迫者

白頭翁湯方內加甘草阿膠各二兩

○東洞子曰當有煩渴症

○東洞子曰當有煩渴症案水病而心下痞鞭煩渴而上逆者

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡

分溫三服

白頭翁黃連黃栢秦皮

各六分

甘草阿膠

各四分

分

右六味以水一合七勺煮取六勺去

滓內膠令消服

產後下利虛極

木防已湯

治水毒心下痞鞭

人參

煩渴

石膏者

木防已二兩

六分

石膏雞子大

一錢六分

桂枝二兩

或喘滿者專主之
方振文恐有脫落

四人參四兩分八

右四味以水六升煮取二升分溫再服以水一合

八勺者
取六勺

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其

脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已

湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈

者宜木防已湯去石膏加茯苓芒消湯主之

木防已去石膏加茯苓芒消湯治心下痞人參

○東洞子曰當有
心下悸證

按木防已湯症而不煩渴心下痞堅及悸者專主之

堅解而悸茯苓者木防已湯方內去石膏

加茯苓四兩芫消三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芫消再微煎分溫再服微利則愈

防已分六桂枝分四人參分各茯苓分八芫消一分錢

右五味以水一合八勺煮取六勺內芫消

令消

膈間支飲。其人喘滿心下痞堅面色黧黑其

脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈未防已
湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈

者

防已茯苓湯

治四肢聶聶動

茯苓防已芍藥

水氣在

○聶與腠同嫩弱
小動見四肢聶聶
此水氣之變也
加水尤良

皮膚

黃耆防已

而上衝

桂枝者

防已黃耆桂枝各三兩

六分

茯苓六兩

一錢二分

甘草

草二兩

四分

右五味以水六升煮取二升分溫三服

以水合

八勺煮○皮水為病四肢腫水氣在皮膚中

四肢聶聶動者

防已黃耆湯 治水病身重防已汗出惡風黃耆

生小便不利水者

防已四兩六分黃耆五兩七分木生五厘姜各二兩

大棗十四枚各四分甘艸二兩三分

右六味以水六升煮取二升分溫三服以水

八勺煮○風溼脉浮身重汗出惡風者○治

風濕一作風水

○東洞子曰分量煎法非古今從外

風水脉浮為在表其人或頭汗出表無他病
病者但下重從腰以上為和腰以下當腫及
陰難以屈伸

枳實芍藥散

治腹滿

枳實

拘攣

芍藥

或痛

芍藥

者

治腹痛宜生薑汁
送下之

枳實芍藥各等分

右二味杵為散服

服紫圓備急大陷
胸輩而不得効者

方寸匕日三服并主瘕膿以麥粥下之

產後腹痛煩滿不得卧○產後腹痛法當以

宜以此方為後方
乃如神且下瘀血

枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有乾血

○枳朮湯家洞子曰當有小便利症。煥曰無用承氣丸尤可。又曰當聞吉子時或以此方合他方以奏奇効。此於吉子則可。於吾輩則不可以。吾之不可學吉子之可。又大不可也。方今妄為加減作合方者有焉豈可不思焉。

○東洞子曰有瘕瘕而胸腹拘滿者主之。

著臍下宜下。瘕血湯主之。亦主經水不利。

枳朮湯

治心下堅滿

枳朮

小便不利

木者

枳實七枚

二分錢

朮二兩

六分

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中

硬即當散也

以水一合煮取六分

心下堅大如盤邊如旋杯水飲吸作

排膿散

治瘕家胸腹拘滿

枳實

若吐粘痰

括梗或

便血

雞子

者

枳實十六枚

一分六分

芍藥六分 桔梗九分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞

黃相等揉和令相得飲和服之日一服

桂枝枳實生薑湯

治胸滿

枳實

上逆

桂枝

或嘔

生薑

者

桂枝生薑各三兩

九分

枳實五枚

一分五錢

右三味以水六升煮取三升分溫三服

以水一合

二勺煮取六勺

○心中痞諸逆心懸痛

枳實薤白桂枝湯

治胸中痞

枳實薤白

滿

厚朴枳實

○吞酸兼參連丸

懸如懸飲之懸

○東洞子曰當有嘔症又曰痞下脫清字

而痛薤白者

枳實四枚厚朴四兩各八錢薤

白半升六錢桂枝一兩二分括蕞實一枚四分

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升

滓內諸藥煮數沸分溫三服以水一合六勺先煮枳實厚朴

取八勺去滓內諸藥煮取六勺

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心

枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之

橘皮枳實生薑湯

治胸中痺橘皮枳實而嘔生

胸痺心中云云症者無示使不利心下痞鞭乃人參湯主之人參湯條可併考
東洞子曰當有嘔証

主吃逆橘皮湯橘皮竹茹湯亦皆同

案當有心下痞鞭

証

凡曰亦主之者說

具于前或為兼用

後方亦可也乎此

在入人畧已

治吞酸兼參連丸

○東洞子曰當有

心下痞鞭證

者

橘皮一斤

二錢四分

枳實三兩

四生五分厘

姜

半斤

一錢二分

右三味以水五升煮取二升分溫再服

以水一合

五勺煮取六勺

○胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘

艸湯主之橘枳姜湯亦主之

茯苓飲

治心下痞鞭

參入

而悸

茯苓

小便不利

米

胸滿

枳實橘皮

而自吐宿水

生薑橘皮

者

茯苓人參米各三兩

六分

枳實二兩

四分

橘皮一

兩半分五 生姜四兩分八

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如

人行八九里進之以水二合煮取六勺

治心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間

虛氣滿不能食消痰氣令能食

橘皮竹茹湯 治胸中痺橘皮而生薑而吃逆竹茹者

橘皮二斤三錢二分 竹茹二升大棗三十枚生薑

半斤各九分 甘艸五兩五分 人參一兩一分

○吃逆一本作嘔逆

右六味以水一斗煮取三升温服一升日三

服

以水二合
煮取六勺

○噦逆者

橘皮湯

治胸中痺

橘皮

而嘔

生薑

噦

橘皮

者

橘皮四兩

二錢

生薑半斤

四錢

右二味以水七升煮取三升温服一升下咽

即愈

以水一合四
勺煮取六勺

乾嘔噦若手足厥者

桂枝茯苓丸

治拘攣

芍藥

上衝

桂枝

心下悸及

茯苓

○桂枝茯苓丸東
洞子曰當有衝逆
心下悸証又曰是非唯治婦人病方也。煥曰此催生之佳友一名奪命

圓又名催生湯案此條恐有脫誤然以臆解之曰以癥瘕害于妊娠故未
 及三月得漏下且
 不止而胎動者有
 焉或子死于腹中
 者有焉或經閉而
 非妊娠者有焉為
 死胎乎為血塊乎
 不易辨也經水如
 斷後三月許經血
 卻利或一日而止
 者亦有焉是妊娠
 而時胎受病以子
 血也非經閉凡妊
 娠中見血下者此
 子死于腹中之徵
 也或其後斷不見

經水有變

牡丹挑仁

或胎動

桂枝芍藥者

桂枝茯苓牡丹挑仁芍藥各等分

石五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前

服一九不知加至三九

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不

止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者

前三月經水利時胎下血者後斷三月不血

也所以血不止若其癥不去故也當下其癥

芎歸膠艾湯

治漏下

阿膠地黃

腹中痛

芍藥艾葉者

芎藭阿膠甘艸各二兩

三分

艾葉當歸各三兩

四分芍藥四兩

六分

乾地黄六兩

九分

右七味以水五升清酒五升合煮取三升去

滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作

以水一合清酒一合煮取六分去滓內膠令消盡

婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕

者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞疸

血者有焉血下不止者亦有焉此所謂漏下不止也癥者有塊之謂與上癥瘕不同既為死胎胎可育且未下而為癥故以為塊已若癥聚則非此方可下豈可謂當下其癥矣死胎見搏搏變證者皆主之夫下死胎者用他攻擊劑甚不可即促命期大可畏哉此解雖似牽強余屢有治驗且間見忽畧而誤者故參悉之四方君子勿疑而擯之

○芎歸膠艾湯東洞子曰凡治吐血下血諸血證者不別男子婦人矣
 煥曰血證有不別男女者焉有不可不別者焉此有為而言已蓋欲救理學之弊也
 婦人每有孕三二月或五六月必墮胎不言者始覺有妊輒服此藥續服不怠以及八九月或終十箇月而免不育之患者不少○代赭石湯宜有欲嘔証

旋覆花代赭石湯

治心下痞鞭

入參噫氣不除

旋覆花
甘草

旋覆花甘州各三兩大棗十

二枚各四分五厘

人參二兩

三分生薑五兩

七分五厘半

夏半升

九分代赭石一兩

五厘

右件七味以水一斗煮取六升去滓再煎取

三升溫服一升日三服

以水二合煮取一合去滓再煎取六

○傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫

氣不除者

○東洞子曰此章非疾病醫義故不取雖然赤石脂禹餘糧湯證可從于此也又云當利其小便下方脫或云脫者五苓散余謂此猪苓湯詳見于古今方考

赤石脂禹餘糧湯

治毒在臍下而利不止赤石

脂禹餘糧者

赤石脂禹餘糧各一斤

一錢六分

已上二味以水六升煮取二升去滓三服

水以

一合八勺煮取六勺

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞅服瀉心湯

已復以他藥下之利不止醫以理中與之利

益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹

餘糧湯主之復利不止者當利其小便

○赤石脂丁名桃
花石
治入痢

桃花湯

治腹痛下利便膿血

赤石脂
粳米者

赤石脂一斤

六錢

乾姜一兩

一分

粳米一升

一錢

右三味以水七升煮米令熟去滓溫七合內

赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

以水二合煮取六分

○赤石脂末方寸匕少陰病下利便膿血

者○少陰病二日至四五日腹痛小便不

利下利不止便膿血者○下利便膿血者

大猪膽汁

治肛中乾燥大便澁者

○蜜皂莢末相和灌穀道中却勝於蜜煎猪膽汁法若急則用蠟油其法如蜜導且不及煎成之即用人家常用蠟挺土瓜根末海蘿汁和為丸用之亦如蜜煎法且別服土瓜根末

蜜煎導

主治見上

蜜七合

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出○陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液內竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導

一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀擾之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如

○藥徵可考
晝夜昏睡數日不
覺者亦間有宜此
方者

○東洞子曰虛煩
當作煩躁

指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道

中以手急抱欲大便時乃去之

酸棗仁湯

治煩燥

酸棗仁

而不得眠

甘者

酸棗仁二升

二錢四分

甘艸一兩

一分

知母茯苓

薊各二兩

二分

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥

煮取三升分溫三服

以水一合六勺煮酸棗仁一合二勺內諸藥煮

取六勺○虛勞虛煩不得眠

○水氣聚於心胸而腹中空虛喘咳

不得卧者主之

三日一劑可至三

四劑此先服小青

龍湯一劑乃進

○上氣說見于越婢加半夏湯標

葶藶大棗瀉肺湯

治浮腫

葶藶

欬逆喘鳴

葶藶

塞胸滿

葶藶

強急

大棗者

葶藶搗丸

如彈丸

大

五分

大棗十二枚

三錢

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮

取一升頓服

以水

下合八勺

先煮棗

取一合

去滓內葶藶煮取六勺

肺癰喘不得卧○肺癰胸滿脹一身面目浮

腫鼻塞涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘

鳴迫塞○支飲不得卧

○宜痔瘻

麻子仁丸 治平日大便秘者

麻子仁二升

十二兩

芍藥枳實各半斤

四兩 大黃

一斤厚朴一尺

各八兩

杏仁一升

六兩

右六味末之煉蜜和九梧子大飲服十九日

三以知為度

○跌陽脉浮而濇浮則胃氣強

濇則小便難浮濇相搏大便則堅其脾為約

已椒蘆黃丸

治腹滿

大黃 葶蘆

口乾舌燥

椒目 防已 二

○椒目治水氣故
截癰
傷寒或以此方間
為兼用

便澁滯

大黃 葶蘆

者

防已椒目葶藶大黃各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一九

日三服稍增口中有津液渴者加芒消半兩

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣

蜀漆散

治寒熱發作有時

蜀漆雲母

而臍下有動

臍下動症

發作有時因水氣

之變

非唯治瘧也寒熱

往來似瘧狀者皆

主之

龍骨

蜀漆雲母龍骨各等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢匕

瘧多寒者名曰牡瘧

○一切水氣痰飲之變胸滿心痛久咳勞熱腹脹肩背痛及脚氣或四肢痛或身体痛等症引胸脇者皆主之或為兼用又云治水腫

十棗湯

治病

水氣

在胸腹

芫花甘遂大戟

掣痛

大棗者

芫花甘遂大戟各等分

右上三味等分各別搗為散以水一升半先

煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人

服一錢匕羸人服半錢溫服之平旦服若下

少病不除者明日更服加半錢得快下利後

糜粥自養

以水一合二勺先煮大棗二錢取六勺內藥末一錢頓服之

大陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人

夫有支飲家云云
條此後世稱勞飲
者已早服此藥乃
可救之

○桔梗白散東洞
子曰有結毒而濁
唾吐膿者主之或
宜熱湯用之法如
走馬湯
煥曰以下三方救
急之妙不可勝而記且雖畏壓弱者皆能治之五苓散標可併考又足

熱熱汗出發作有時頭痛心下痞鞅滿引脇

下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未

和也○病懸飲者○欬家其脉弦為有水○

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至二百

日一歲

桔梗白散 治毒在胸巴豆咽桔梗或吐下如膿

汁桔梗者 桔梗貝母各三分巴豆一分

右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病

急之妙不可勝而記且雖畏壓弱者皆能治之五苓散標可併考又足

寫白散備急之三方不獨備于急空而已諸痼難症結毒及廢疾之人宜為後方以攻之如三其運用便在人人之畧也若善達其術則諸方為表裡乃互相成其用再快之妙不唯在此方爾亦不可不知焉夫濟世之士知治病有前方後方則思過半矣小建中湯條曰腹中急痛者先與小建中湯不差者與小柴胡湯不知者謂仲景亦有所不能邪

在膈上者吐膿而膈下者瀉出若下多不止飲冷水一杯則定

欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿寒如米粥者為肺癰病在陽應以汗解之反以冷水濕之若灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯白散亦可

服

走馬湯

治胸腹有毒

巴豆杏仁

若心痛

巴豆杏仁

若腹

痛

巴豆

巴豆杏仁各一枚

右二味以綿纏捥令碎熱湯二合捻取白汁

飲之當下老少量之通治飛尸鬼擊病

以熱湯六

勿餘如

○中惡心痛腹脹大便不通

備急圓

治心

乾姜

腹大

卒痛

巴豆

者

大黃乾姜巴豆各一兩

此何似企望偶中者之為也余案此說甚非矣曰先與小建中湯先也者預設後方之言也其他設數方以速其功者不為少也因是觀之治有前後兼用方者古之道也明矣雖然前方不得其所則後方亦無効矣要之執己家之妙計但在方與症相對而已東洞翁之教久亦此耳夫登高者必負

重萬里之行必負一步殆失方證於近索不熟於

遠而不免目睫之謂者余謂之迷方之士豈可不思焉。桔梗白散卒
中小兒驚風牙關
不關者入之鼻中

右藥各須精新先搗大黃乾姜為末研巴豆
內中合治一千杵用為散蜜和丸亦佳密器
中貯之莫令散氣

主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿
卒痛如錐刺氣急口禁停尸卒死者以暖水
若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令
下咽須臾當差如未差更與二九當腹中鳴
即吐下便差若口禁亦須折齒灌之

○加膠皮尤良

阿膠一味煎洗亦

奇

四肢身体諸痛皆洗之有効

○為瘻用劑是也

大麥汁能利小便

礬石湯 治脚氣痿弱不仁上入搶心者

礬石二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

治脚氣冲心

消礬散 治一身悉黃腹脹如水狀石消大便黑

消時瘡礬者 消石礬石各等分

右二味為末以大麥粥汁和服方寸匕日三

服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候

○黑疽腹滿者極
為難治方上勿忽
諸

○蛇床子楮木皮
礬石各等分加五
倍子少許煎洗陰
中而後內藥尤良

也○黃家口晡夜發熱而反惡寒此為女勞
得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱
因作黑疽其腹脹如水狀大便必黑時唐此
女勞之病非水也腹滿者難治

礬石丸 治婦人經水不利下白物者

礬石三分杏仁一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者
再內之○婦人經水閉不利藏堅癖不止中

○宜先洗陰中而
後內藥法如上方
又治陰中腫痛

有乾血下白物

蛇床子散 治婦人下白物陰中痒或有小瘡

者蛇床子仁

右一味末之以白粉少許相得如棗大

綿裹內之自然溫

溫陰中坐藥

類聚方集覽下終

和藁方集覽誤字扱上

○本文

○標注

○標掲元本標掲ニ誤リ今正ス序文○桂枝湯標注元本救條ヲ脱ス今補入ス○丁
ハ下ノ誤ニテウ六行○若形如癰ノ四字ノ圈点有ヘシウ六行○發奔豚域スルハ誤ユテオ
六行○加ハ如ノ誤六丁ウニ行セテオ五行ハテオニ行同○贅言言ハ贅言ノ誤六丁ウオ
セテオ未○發熱不止以下八字ノ圈点有ヘシテオ○方後元本方下ニ誤ル今正ス九丁ウ○
冒狀元本冒狀ニ誤ル今正ス十丁オ○用此方其人大便硬十丁オ○用之大便不硬之人日上
○瞑眩元本冒逆ニ誤ル今正ス目オ○不暇止而攻病日ウ○相逐庭十丁オ○氣分「」ノ域
ト圈点トアルヘシテウ○可称痰飲之變之一也一テウニ行○又手ハ又手ノ誤十丁ウテウ日
○四枝ハ四枝ノ誤十五丁オ○胸ノ下ニ腹字ヲ脱十ハ丁オ○人參湯ノ上ノ有ヘシテウ初ノ舉
體リテヲニテウ六行○若冒眩ハ苦冒眩ノ誤標同又案標注冒眩ノ下再シ冒眩ノ二字ヲ加フ
ヘシテウ○不見ハ可見ノ誤十九丁オ九行○以飲一「」ル九丁オ六行八味丸下並標皆同○臆脱
ハ臆說ノ誤三十丁ウオ○半夏下ニ各字ヲ脱ス三十丁オ六行○其ハ共ノ誤日ウ○僂入ハ僂入

ノ誤日以下皆同○兼主以下八字○圈点有ヘシ三十九丁六行ノ半復上加字有ヘシ四十二丁オノ桂
桂ハ桂枝ノ誤日未○太陽與以下十二字○圈点ヲ加ヘシ日ウ五行○黃苓ハ黃芩ノ誤四
三丁オ六行○陽脉以下八字○圈点ヲ除クヘシ四十四丁ウ行○不得臥ノ臥字汗ノ誤四十二丁ウ行
○心胸若ノ三字四肢苦ノ誤四十七丁オ未○四肢下ノ若字苦ノ誤日ウ四行下七行同ノ難愈
者ノ下ニ與五苓散乃愈ノ六字アルヘシ五十三丁ウ初行下ノ卷ノ大小承ノ下氣字ヲ脱ス
ニ四行○不鞭者ノ三字墨引ハ誤五十五丁オ五行○宜桂枝湯ノ四字墨ヒキハ誤六十四丁ウ四行○
心煩ノ下之濡ノ下元本黃芩ト有ハ誤今大黃ニ作ル丁ウ七行ノ惡對人厭煩翼日ノ汚
心湯標ニ金瘡並ニ血淋ニ奇効有リ補入スヘシ九丁ウノ提出ハ提出ノ誤十一丁ウ○瘕ハ瘕
ノ誤十三丁ウノ觀ハ觀ノ誤十六丁オ○桂枝ハ桔梗ノ誤十七丁ウ○胃氣不和ノ四字ノ圈点
ヲ加ヘシ十八丁ウ三行下九丁オ六行九丁オ三行皆同○喜悲傷ノ誤十九丁ウ四行ノ故藥ハ故余ノ誤
二十丁オ
行ノ及可ハ及可ノ誤日未○一分五厘ハ七分五厘ノ誤九十三丁オ未○脉微ハ脉微ノ誤九十四丁オ
大行○半復ノ下年升ノ二字ヲ脱ス九十五丁オ未ノ燥躁ハ煩躁ノ誤日○附子一兩ハ一枚ノ誤

六丁ウ二行○下利ノ下脉微者ノ三字カ又ハ下文不致カ有ヘシ日三行○服湯以下十一字
「」域スル者大誤日七丁ウ四行○復ハ腹ノ誤日ウ二行○一方用桂ノ四字注文又桂ノ下ニ
四兩ノ二字有ヘシ日ハ丁オ末○二九ハ三九ノ誤日ウ三行○其人以下ノ四字墨引有ヘシ
此九丁オ末西ニ熱身重ノ一條恐クハ寫誤有シ三丁オ○心中ノ「」鞭滿ノ下ニ若
熱痛ノ二字有ヘシ三丁オ○胸ハ心煩ノ誤腹煩滿ハ胸腹滿ノ誤三丁ウ二行○葶
藶半升元本半升ニ誤今正ス此五丁ウ六行直ハ真ノ誤○胸痺「」域ト○圈
ト有ヘシ日ウ○取ハ作ノ誤日五行○咽下ハ咽中ノ誤此ハ丁四行○呃家元本吐家ニ誤今
正ス三十九丁オ五行○婦人ノ二字「」域有ヘシ四丁オ二行○生姜ノ上ニ加字有ヘシ四十三
丁オ二行○麻米ハ麋ノ誤四十五丁オ五行○不得眠ノ注ニ雞子黃ヲ補入スヘシ日ウ行○
四勺ハ六勺ノ誤四十丁オ二行○二分ハ九分ノ誤五十二丁ウ行○蜜導煎ハ蜜煎導ノ
誤五十六丁ウ四行○諸痼癢疾ハ諸痼難症ノ誤六丁オ
既試方○分温ハ温服ノ誤二丁ウ
四行○麻黄ハ麻仁ノ誤四丁オ二行○心中温ハ心中温温日ウ二行○憂ノ下傷字ヲ脱ス六丁

「三行」の頭痛有熱但桂枝症而已若六七日不大便且小便不清者乃承氣症也服承氣湯則上衝得降若小便清者宜服桂枝湯の復煩者病未盡故也小柴胡湯有此例宜併觀の清便自調者謂清穀止也清穀雖止身疼痛未愈者猶宜四逆輩恐非桂枝湯症の稱陽明病者有潮熱譫語燥屎等之症是也

右四條桂枝湯標元本脱文ニテオウ


此書刻既に成時に重ク病ヲ物モ覺エヌ内ニモけ出ノヲ言出スヲ杯モ有ケラシ依ラ人々摺立仕立等ノヲ取イッキ病床ニサヘ持ヨセラ見セシト病愈テ能ミシハ誤字モマモアリ板ノサラハ殊ニワロシサレ程イク通方ノ經驗アル限ヲ集ラ此書ノ後編トモヲボシク仕ラキタリヲ板トエルベケレハ其ツイデニ直スベキハ直シテ誤字トラモ心有ン人ハ推量ニ知ベキワサレハト思ヘリシ程ノ誤字ヲアラクトテ子弟ノ書取見セケレハ其懇志モ捨ガタク直ニカクモノシテ集改ノ末ニヤタリ

お年賜言先主古く才高出衆
家名極高之御子嗣之世に
由來之御運道之世に
之妙何待其之及若此世乃
之曰益出之妙後何に加之力
之此則成其之少天守御美徳

可急哉之爲之何因以生
此豈以私一云書之何云

門人下總

大川唐之亮跋



QV K477 v 1803

木島藏屋

七
五
下

